

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ

БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС

Плоские черви

- примитивные червеобразные беспозвоночные, не имеющие полости тела.



Плоские черви обитают в солёных и пресных водах; некоторые виды приспособились к жизни во влажных наземных местообитаниях, многие паразитируют на различных группах животных, как позвоночных, так и беспозвоночных. Многие причиняют значительный вред животноводству, вызывая заболевания, а иногда и гибель скота. Некоторые плоские черви служат причиной серьезных заболеваний людей.

*В настоящее время описано около **25 000** видов, в России – более **3000** видов*

Общая характеристика типа


- Многие плоские черви – паразиты.**
- У плоских червей **трехслойное тело.**
- Плоские черви имеют **двустороннюю симметрию тела.**
- Промежутки между органами у плоских червей заполнены **жидкостью.**
- Все плоские черви имеют **одинаковую пищеварительную систему.**
- Плоские черви дышат **всей поверхностью тела.**
- Выделительная система плоских червей представлена **почками.**
- Нервная система плоских червей - **диффузная.**
- В основании плоских червей – **сернистые диски.**

Признаки плоских червей, характерные для всех классов червей.



- наличие переднего конца тела, с расположеннымными на нем основными органами чувств: зрения, осязания, обоняния и др., что позволяет этим животным лучше ориентироваться в пространстве и совершать направошний**
- двусторонняя симметрия;**



3) появление в процессе развития третьего зародышевого листка (мезодермы), закладывающегося между экто- и энтодермой; это привело к развитию мышечной системы а значит, к увеличению двигательной



4) наличие кожно-мускульного мешка, т. е. стенки тела, образованной кожным эпителием и мышцами, которые представляют собой обособленные образования.



□ Пищеварительная система свойственна не всем плоским червям. У ленточных червей, в связи с паразитическим образом жизни, редуцируется.

□ У других плоских червей пищеварительная система состоит из двух отделов: переднего и среднего.

Передний начинается ртом, который ведет в глотку. Из глотки пища переходит в



■ Анального отверстия нет, поэтому непереваренные частицы выбрасываются через рот.
закапчиваются слено.

□ Органы дыхания.

Специальные органы дыхания отсутствуют. Свободноживущие черви и эктопаразиты дышат через покровы, эндопаразиты, живущие в среде бедной кислородом, получают энергию за счет гликолиза.

□ Кровеносная система


отсутствует. Кишечник у подавляющего большинства червей сильно разветрен, питательные вещества из стенок кишечника



Выделительная система

□ Выделительная система представлена системой разветвленных каналцев, с звездчатыми клетками (протонефридии)






Нервная система напоминает решетку.
Состоит из парного мозгового ганглия и идущих от него нервных стволов, соединенных кольцевыми перемычками. Обычно особого развития достигают два продольных ствала. Органы чувств наиболее хорошо развиты у свободноживущих. Некоторые имеют органы равновесия — статоцисты, почти всегда имеются глаза. Есть рецепторы для восприятия механических и химических раздражений.

fppt.com

Половая система



Система
Планарии — гермафродиты, т. е. одна и та же особь несет как мужские, так и женские половые органы.

Основной способ размножения — половой.

Оплодотворение у планарий перекрестное.

*После оплодотворения яйца покрываются плотными оболочками и образуются **коконы**, которые животные прикрепляют к различным подводным предметам. У молочной планарии из кокона выходят молодые животные, похожие на взрослую особь. У многих других представителей этого класса кокона выходит **личинка**, лишь спустя некоторое время превращающаяся во взрослое животное (**развитие с метаморфозом**).*



ВЫВОДЫ

Активное передвижение привело к ряду крупных ароморфозов, которые позволили повысить общий уровень организации животных:

1. Они стали **двустороннесимметричными**, появляется передняя часть тела, на которой концентрируются нервные клетки, формируются органы чувств. Появляется спинная — дорсальная, брюшная — вентральная и боковые — латеральные стороны тела;
2. Нервная система усложняется, нервные клетки концентрируются и объединяются в **нервные узлы и нервные стволы**, что обеспечивает более сложное поведение.
3. Формируется третий зародышевый листок — **мезодерма**, из которого образуются внутренние органы;
4. Появляется **мышечная ткань**, с помощью которой животные получают возможность быстро передвигаться;
5. Усложняется пищеварительная система, формируется **кишечник**, обеспечивающий более эффективное пищеварение.
6. Образуется выделительная система, состоящая из специализированных клеток — **протонефридиев**;

Класс Ресничные черви



планария белая



турбеллярия

- Тело удлинённое, плоское.
- Почти все представители этого класса имеют реснички на поверхности тела. Реснички помогают плавать или перемещаться по дну, как, например планарии белой.
- У наземных видов движение обеспечивают реснички, расположенные на брюшной стороне тела.
- Многие ресничные черви – хищники и нападают на более крупную добычу. Однако есть черви, питающиеся водорослями или ведущие паразитический образ жизни.

Класс Сосальщики

Тело листовидное, нерасчленённое. Черви этого класса ведут паразитический образ жизни. В связи с этим у них имеются специальные органы прикрепления – **присоски**.



Ланцетовидный
сосальщик



Сибирская
двуустка




Печеночный
сосальщик

Класс Сосальщики

Как все паразиты, сосальщики производят большое количество яиц. Имеет место и живорождение. Развитие сосальщика осуществляется с чередованием поколений: то паразитирование в различных хозяевах, то свободный образ

Цикл развития печеночного сосальщика



Промежуточный хозяин- организм, в котором развиваются и находятся некоторое время личинки червя. У печеночного сосальщика- это малый прудовик.

Окончательный (Основной) хозяин- организм, в котором живет и размножается взрослый червь. У печеночного сосальщика- это крупный и мелкий рогатый скот, лошади, человек.

Класс Ленточные (Cestoda)




Класс Ленточные черви насчитывает более **3000** видов червей, ведущих исключительно паразитический образ жизни. Лентовидное тело может достигать в длину до **10 м** и более. На передней части тела находится **головка** с органами фиксации — присосками или крючками, за которой следует **шейка** и затем тело, состоящее из члеников.

Самые маленькие и самые молодые членики — около шейки, самые крупные — в задней части тела. Новые членики постоянно образуются в задней части шейки.

- Количество члеников тела может достигать от 2-5 до нескольких десятков тысяч.
- Представители этого класса ведут паразитический образ жизни.
- Большинство червей **не имеют** органов пищеварения.
- Хорошо развита **половая система**.

Класс Ленточные черви

Цикл развития бычьего цепня



Длина тела взрослого червя 10-12 м.

Основной хозяин – человек. Паразитирует в кишечнике.

Промежуточный хозяин – крупный рогатый скот.