

МУХОМОР КРАСНЫЙ

Алфёров А.А. 22.11.2018.

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА РАСТЕНИЯ И МЕСТО В НАУЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

- ❑ **Мухомор красный** (лат. *Amanita muscaria*) — гриб рода Мухомор, или Аманита (лат. *Amanita*) порядка агариковых (лат. *Agaricales*), относится к базидиомицетам.
- ❑ Шляпка размером от 8 до 20 см. Мякоть белая, под кожицей светло-оранжевая или светло-жёлтая, с лёгким запахом. Пластинки шириной 0,8—1,2 см, белые или кремовые, частые, свободные, имеются многочисленные промежуточные пластиночки. Ножка цилиндрическая, высотой 8—20 и диаметром 1—2,5 см, белая или желтоватая, с клубневидно-утолщённым основанием, у зрелых грибов полая



ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ПЛОДОНОШЕНИЯ.

- Микоризообразователь преимущественно с берёзой и елью. Растёт на кислых почвах, обычный гриб в лесах умеренного климата Северного полушария, в горах встречается до верхней границы леса. В России распространён повсеместно. Сезон роста — с августа по октябрь. Встречается также на территории всей Европы умеренного климата, Азии, Северной Америки и даже в Австралии.

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ ?

- Токсические и психоактивные вещества хорошо растворяются в горячей воде, и употребление грибов, отваренных в нескольких водах, приводит к менее сильному отравлению, однако содержание ядов в плодовых телах может сильно варьировать, что делает употребление мухоморов в пищу опасным (требуется уточнение).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ РАБОТАЮЩИХ ГИПЕРССЫЛОК

- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9>