

Что обозначается
этимими величинами в
химии?

ω , см, χ




Тема урока:

«Способы выражения концентрации растворов»



Цели урока:


- расширить и систематизировать представления о способах выражения концентрации растворов;
- изучить новые способы выражения концентраций растворов;
- учиться применять полученные теоретические знания при решении задач;
- развивать интеллектуальные умения и навыки.



Концентрация — величина, характеризующая количественный состав раствора.

Согласно правилам ИЮПАК Согласно правилам ИЮПАК, концентрацией растворённого вещества (не раствора) называют отношение количества растворённого вещества или его массы к объёму раствора (моль/л, г/л), то есть это соотношение неоднородных величин. Те величины, которые являются отношением однотипных величин (отношение массы растворённого вещества к массе раствора, отношение объёма растворённого вещества к объёму раствора) правильно называть долями. Однако на практике для обоих видов выражения состава применяют термин **концентрация** и говорят о концентрации растворов.

Способы выражения концентрации растворов

- 1 Массовая доля (весовые проценты, процентная концентрация)
 - 2 Объёмная доля
 - 3 Молярность (молярная концентрация)
 - 4 Мольная доля
 - 5 Моляльность (моляльная концентрация)
 - 6 Титр раствора
 - 7 Нормальность (молярная концентрация эквивалента)
 - 8 Растворимость вещества
- 

Процентная концентрация, массовая доля растворённого вещества

Массовая доля растворённого вещества-это отношение массы растворённого вещества к массе раствора.

$$\omega = \frac{m_{\text{р.в}}}{m_{\text{р-ра}}}, \text{ где } m_{\text{р.в}} - \text{масса растворённого вещества}$$

$m_{\text{р-ра}} - \text{масса раствора}$


Для расчёта процентной концентрации используется формула:

$$\omega \% = \frac{m_{\text{р.в}}}{m_{\text{р-ра}}} \cdot 100 \%$$

Раствор состоит из растворённого вещества и растворителя. Массу раствора можно определить по формуле:

$$m_{\text{р-ра}} = m_{\text{р.в}} + m_{\text{р-рителя}}$$

В бинарных растворах часто существует однозначная зависимость между плотностью В бинарных растворах часто существует однозначная зависимость между плотностью раствора и его концентрацией (при данной температуре). Это даёт возможность определять на практике концентрации важных растворов с помощью денсиметра В бинарных растворах часто существует однозначная зависимость между плотностью раствора и его концентрацией (при данной температуре). Это даёт возможность определять на практике концентрации важных растворов с помощью денсиметра (спиртометра В бинарных растворах часто существует однозначная зависимость между плотностью раствора и его концентрацией (при данной температуре). Это даёт возможность определять



Зависимость плотности растворов H_2SO_4 от её массовой доли в водном растворе при 20°C



Объёмная доля

Объёмная доля — отношение объёма растворённого вещества к объёму раствора. Объёмная доля измеряется в долях единицы или в процентах.

$$\varphi = \frac{V(\text{в-ва})}{V(\text{р-ра})}$$

где: $V(\text{в-ва})$ — объём растворённого вещества, л;
 $V(\text{р-ра})$ — общий объём раствора, л.

Как было указано выше, существуют ареометры, предназначенные для определения концентрации растворов определённых веществ. Такие ареометры проградуированы не в значениях плотности, а непосредственно концентрации раствора.

Молярность

(молярная концентрация)

Молярность — число молей растворённого вещества в единице объёма раствора.

$$M = \frac{\nu}{V}$$

где ν - количество растворённого вещества, моль;
 V - объём раствора, л

Молярность чаще выражают в моль/л или ммоль/л. Возможны следующие обозначения молярной концентрации - С, См, М.

Так, раствор с концентрацией 0,5 моль/л называют 0,5-молярным (0,5М).


Мольная доля

Мольная доля (X) — отношение количества молей данного компонента к общему количеству молей всех компонентов. Мольную долю выражают в долях единицы.

$$X = \frac{v(\text{в-ва})}{\sum v(\text{в-в})}$$

v — количество компонента, моль;

$\sum v$ — сумма количеств всех компонентов, моль.



Моляльность (моляльная концентрация)

Моляльность — число молей растворённого вещества в 1 кг растворителя.

Измеряется в моль/кг, Так, раствор с концентрацией 0,5 моль/кг называют 0,5-моляльным.

$$C_v = \nu / m(\text{р-ля}),$$

где: ν — количество растворённого вещества, моль;
 $m(\text{р-ля})$ — масса растворителя, кг.

Следует обратить особое внимание, что несмотря на сходство названий, молярность и моляльность величины различные. Прежде всего, при выражении концентрации в моляльности, в отличие от молярности, расчёт ведут на массу растворителя, а не на объём раствора. Моляльность, в отличие от молярности, не зависит от температуры.

Титр раствора


Титр раствора — масса растворённого вещества в 1 мл раствора.

$$T = m(\text{в-ва}) / V(\text{р-ра}),$$

где: $m(\text{в-ва})$ — масса растворённого вещества, г;

$V(\text{р-ра})$ — общий объём раствора, мл;

В аналитической химии обычно концентрацию титранта пересчитывают применительно к конкретной реакции титрования таким образом, чтобы объём использованного титранта непосредственного показывал массу определяемого вещества; то есть титр раствора показывает, какой массе определяемого вещества (в граммах) соответствует 1 мл титрованного раствора.



Нормальность (молярная концентрация эквивалента)

Нормальность (Сн) — число эквивалентов данного вещества в одном литре раствора. Нормальность выражают в моль-экв/л. Часто концентрацию таких растворов выражают как «н». Например, раствор содержащий 0,1 моль-экв/л называют децинормальным и записывают как 0,1н.

$$C_n = \frac{\Sigma}{V} \text{ (р-ра)}, \quad \text{где:}$$

Σ — эквивалент, моль-экв;

V — общий объём раствора, л;

$$C_n(\text{щёлочи}) \cdot V(\text{щёлочи}) = C_n(\text{кислоты}) \cdot V(\text{кислоты})$$

Коэффициент растворимости

Очень часто концентрацию насыщенного раствора, наряду с вышеперечисленными характеристиками, выражают через так называемый **коэффициент растворимости** или просто **растворимость** вещества.

Отношение массы вещества, образующего насыщенный раствор при данной температуре, к массе растворителя называют **коэффициентом растворимости**:


$$K_p = m(\text{в-ва}) / m(\text{р-ля})$$

Растворимость вещества показывает максимальную массу вещества, которая может раствориться в 100 г растворителя:

$$p = (m_{\text{в-ва}} / m_{\text{р-ля}}) \cdot 100\%$$

Задачи

1. Определите молярную концентрацию хлорида натрия в 24%-ном растворе его плотностью 1,18 г/мл. (Ответ - 4,84 М)
2. Определите молярную концентрацию соляной кислоты в 20%-ном растворе плотностью 1,098. (Ответ - 6М)
3. Определите молярную концентрацию азотной кислоты в 30%-ном растворе ее плотностью 1,18 г/мл. (Ответ - 5,62 М)
4. Вычислите массовую долю гидроксида калия в водном растворе с концентрацией 3М и плотностью 1,138 г/мл. (Ответ - 15 %)
5. Сколько мл 56 %-ного раствора серной кислоты (плотность-1,46г/мл) нужно для приготовления 3 л 1М раствора? (Ответ - 360 мл)

- 
- 6. К воде массой 200 г прилили 2М раствор хлорида калия объемом 40 мл и плотностью 1,09 г/мл. Определите молярную концентрацию и массовую долю соли в полученном растворе, если его плотность оказалась равна 1,015 г/мл. (Ответ - 0,33М, 2,45%)
 - 7. Сколько г гидроксида калия нужно для нейтрализации 300 мл 0,5 М раствора серной кислоты? (Ответ - 16,8 г)
 - 8. Какой объем 2 М раствора гидроксида калия вступит в реакцию: а) с 49 г серной кислоты б) с 200 г 24,5%-ного раствора серной кислоты? В) с 50 г 6,3%-ного раствора азотной кислоты?
 - 9. Какой объем 3М раствора хлорида натрия плотностью 1,12 г/мл надо прилить к воде массой 200 г , чтобы получить раствор с массовой долей соли 10%? (Ответ - 315 мл)
 - 10. Какой объем 3М раствора хлорида калия потребуется для приготовления 200 мл 8%-ного раствора соли с плотностью 1,05 г/мл? (Ответ - 75,2 мл)
 - 11. 2,8 л аммиака растворили в воде, объем раствора довели до 500 мл. Какое количество вещества аммиака содержится в 1 л такого раствора? (Ответ - 0,25 моль)