



«Стоп ВИЧ/СПИД»

*Дмитриев Алексей Викторович
Ведущий инспектор-врач лечебно-профилактического отдела
Региональной дирекции медицинского обеспечения*

17 мая 2016 года



В период с 10 по 20 мая 2016 года проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Организатором мероприятия является Фонд социально-культурных инициатив при участии Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Президентом ОАО «РЖД» О.В. Белозёровым принято решение о поддержке данной инициативы.

ВИЧ ИНФЕКЦИЯ-

вирус иммунодефицита человека, который является возбудителем болезни, называемой ВИЧ – инфекция. Эта болезнь имеет несколько стадий, последняя из которых называется СПИД.


СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

Синдром- совокупность признаков и симптомов данного заболевания, *приобретенного* - генетически не обусловленного, а полученного в процессе жизнедеятельности, *дефицита* – недостатка в данном случае в работе иммунной системы.

Пути передачи ВИЧ – инфекции:

1. Половой путь – любые виды незащищенного секса
2. У наркоманов – при использовании одного шприца для введения наркотика
3. При переливании инфицированной крови от донора к реципиенту
4. При использовании не стерильных медицинских инструментов
5. Во время родов от матери к ребенку, во время беременности через плаценту, при кормлении грудью (если мать ВИЧ – положительная)

При внутривенном введении наркотиков



наркоманы часто
пользуются
общими
шприцами,
поэтому риск
заражения очень
высокий

При переливании крови, пересадке органов и тканей

от инфицированного
донора



При использовании нестерильных медицинских инструментов

- при прокалывании ушей
- пирсинге
- татуировке



От инфицированной матери



- внутриутробное заражение во время беременности
- при родах
- через грудное молоко ВИЧ – инфицированной матери

ВИЧ не передаётся:

- при прикосновении и рукопожатии
- при поцелуе
- при объятиях
- при питье из одного стакана
- при пользовании общей одеждой или постельным бельем
- при укусах насекомых и животных



Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории России на 31.12.2015 г.

□ всего инфицированных – 1006388 человек

□ детей – 9776

□ детей рожденных ВИЧ инфицированными матерями – 7617

□ из них умерло:

- всего – 166013

- детей – 727

Из них больных СПИДом:

□ всего – 54817 человек

□ детей – 449

□ из них умерло:

- всего – 46990

- детей - 328

Число впервые выявленных инфицированных ВИЧ в 2015 году - 93188

Диагностика ВИЧ – инфекции.

В настоящее время основным диагностическим методом при ВИЧ-инфекции является выявление антител к вирусу, производящееся преимущественно с применением методики ИФА. В случае положительного результата исследуют сыворотку крови с помощью методики иммунного блоттинга и ПЦР. Невыявление с помощью блоттинга антител характерной молекулярной массы, однако, не исключает ВИЧ. В инкубационный период иммунный ответ на внедрение вируса еще не сформирован, а в терминальной стадии в результате выраженного иммунодефицита антитела перестают вырабатываться.

Диагностированная серологическими и вирусологическими методами ВИЧ-инфекция является показанием к динамическому наблюдению состояния иммунного статуса.

Меры профилактики

В мире пока еще не изобретены лекарства и вакцины, которые могли бы излечить от ВИЧ-инфекции или предупредить заражение. Исход болезни смертелен. Только безопасное поведение и ответственное отношение к своему здоровью защитят от заражения вирусом иммунодефицита человека.

ПРОГНОЗ

Средняя продолжительность заболевания от момента заражения ВИЧ до гибели – 11 лет. Некоторые больные погибают значительно раньше, отдельные больные переживают 15 и более лет.

***СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ***