

Презентация по научной работе на тему

«Численные методы и оптимизация
траекторий межпланетных траекторий»

НИЯУ МИФИ,
2020


Подготовили студенты группы Б20-215
Халимов Тимур и Кузин Алексей
Руководитель практики :к. ф.-м. н.
Шильников Кирилл Евгеньевич

Задачи, поставленные на второй семестр

Суть нашего проекта заключается в моделировании и оптимизации траектории полетов космических аппаратов при помощи вычислительных алгоритмов, основанных на методах численного исчисления.



На второй семестр была поставлена решения задачи двух тел при помощи численных методов, а конкретно методов семейства Рунге-Кутта и методов Эйлера. Далее провести их сравнение с аналитическом решением, исследовать методы на сходимость, построить соответствующие различным значениям шага по сетке разностные схемы.



Задача двух тел

$$\vec{r}'' + \chi \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0, \quad \chi = Gm_0.$$

Для случая двух подвижных тел получим два уравнения:

$$m_1 \vec{r}_1'' - G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} = 0,$$


$$m_1 \vec{r}_2'' + G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} = 0$$
$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$

Для дальнейших вычислений нам понадобится интеграл площади, энергии и Лапласа :


$$\vec{r} \times \vec{r}' = c,$$

$$\frac{(\vec{r}')^2}{2} - \frac{\chi^2}{r} = h$$

Задача двух тел



Преобразование координат



Работа с эллиптической орбитой

Задача Коши

Рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся задач — задачу Коши. По заданному условию находится функция $x(t)$ при помощи интегрирования и дальнейшего использования начального условия. Ниже приведен общий вид задачи Коши:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t),$$

$$x(0) = x_0$$

Далее, при помощи метода сеток и конечных разностей ищется сеточная функция, область определения и значения которой дискретны.

Ниже приведены различные методы нахождения искомой сеточной функции:

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\tau} = f(x_n, t_n) \quad \text{- явная схема Эйлера}$$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\tau} = f(x_{n+1}, t_{n+1}) \quad \text{- неявная схема Эйлера}$$

$$\frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2\tau} = f(x_n, t_n) \quad \text{- схема центральной разности}$$

Сходимость методов

Метод	Локальная ошибка	Глобальная ошибка
Явный метод Эйлера		
Неявный метод Эйлера		
Схема с центральной разностью		
Классический метод Рунге-Кутта 4-го порядка		
Метод Рунге-Кутта 2-го порядка		

На данном изображении приведен вывод программы, показывающий параметры, нужные для аналитического решения.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface with the following details:


- File menu:** File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Run, Tools, VCS, Window, Help.
- Project tab:** two_body / display.py
- Run tab:** display
- Output window content:**

```
r0 = [1.0,-0.5,0.0]
m: 170
v0 = [0.5882352941176471,-1.4705882352941178,0.0]
r0 = [0.4117647058823529,-0.20588235294117646,0.0]
Вектор r: = [1.0,-0.5,0.0]
Вектор скорости r_v: = [-1.0,-6.0,0.0]
Вектор секторной скорости: = [0.0,-0.0,-6.5]
Вектор Лапласа: = [-0.6650154262940335,0.40897830138231084,0.0]
Константа интеграла энергии: -133.5526224699857
Линия узлов не определена, Q = undefined
Q : None
i : 3.141592653589793
Фокальный параметр: 0.2485294117647059
Эксцентриситет: 0.7807104253246497
Большая полуось: 0.6364532453797582
Эллипс
Поворачиваем относительно x на угол i:3.141592653589793

r = [1.0,0.5,6.123233995736766e-17]
g:-2.5902234379981675
Поворачиваем плоскость на угол g:-2.5902234379981675
c = [4.169985034786629e-16,6.780566025570362e-16,6.5]
[-1.11373507e+00 9.79500027e-02 6.12323400e-17]

n 25.67879869036944
```

Пример работы программы



- Напомним, что есть сходимость и порядок сходимости метода. Сходимость: $\|x_\tau - \chi_\tau\| \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow 0$, $\|x_\tau - \chi_\tau\| \leq C\tau^q$, где q - порядок сходимости, χ_τ – значение аналитического решения при данном разбиении сетки в данный момент, значение численного метода при данном разбиении сетки в данный момент, $f(\tau) = \|x_\tau - \chi_\tau\|$ – разностная функция, C – некоторая константа Рунге – Кутта.
- Согласно теории, порядок сходимости q у классического метода Рунге-Кутты – 4, у схемы Эйлера – 1. Иначе говоря, $f(\tau) = O(\tau^4)$ при $\tau \rightarrow 0$ для Рунге-Кутты, $f(x) = O(\tau)$ при $\tau \rightarrow 0$ для явной схемы Эйлера. То есть в некоторой окрестности нуля мы ожидаем, что разностная функция, например для Рунге-Кутты, будет ограничена сверху τ^4 , умноженной на константу. Мы решили брать максимальное значение $f(\tau)$ в окрестности афелия(в перигелии по нашим наблюдениям скорость сходимости получается ниже) в окрестности нуля τ . Качественно, мы ожидаем получить для явной схемы Эйлера на графике нуля прямую, для

Разностные схемы




Схема для явного метода Эйлера
порядка




Схема для метода Рунге-Кутта 4

Список литературы:

- [1] Федоренко Р.П., «Введение в вычислительную физику». – 1994
- [2] Калиткин Н.Н., «Численные методы». – 1978
- [3] Муха В.С., «Вычислительные методы и компьютерная алгебра». – 2010
- [4] Савельев И.В., «Курс физики – том 1 – Механика. Молекулярная физика». – 1989
- [5] Холшевников К.В., Титов В.Б., «Задача двух тел».- 2007

Ссылка на GitHub с исходными кодами:

https://github.com/teodor-r/two_body



Процесс решения задачи

- Построение математической модели заданного физического процесса
- Компьютерное моделирование процесса при помощи построенной математической модели
- Нахождение аппроксимированной зависимости при помощи численных методов

Полученные результаты

При решении задачи о движении тел, брошенного под углом к горизонту, использовались такие физические законы, как: II закон Ньютона, закон всемирного тяготения.

При решении использовалась явная схема Эйлера: был взят бесконечно малый промежуток времени, и для каждого значения искалось приращение радиус — вектора.


Получаем зависимость радиус — вектора от времени на выбранной временной сетке.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$
$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \tau \vec{v}$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \tau (\vec{v}_0 + \vec{g} \cdot t_n)$$

Полученные результаты



Полученные результаты

Далее была решена задача, в которой рассматривается два тела, одно из которых покойится, А другое движется под действием сил тяготения. В решении этой задачи были также использованы II закон Ньютона и закон всемирного тяготения.

Далее, при помощи явной схемы Эйлера была получена сеточная зависимость радиус — вектора от времени.

$$\vec{F} = -\gamma \frac{Mm}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{F} = m\vec{w}$$


$$\vec{w} = -\gamma M \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \int \vec{w} dt = -\gamma M \int \frac{\vec{r}}{r^3} dt$$

$$\frac{\vec{r}_{n+1} - \vec{r}_n}{\tau} = \vec{v}(\vec{r}_n, t_n)$$


$$\vec{r}_{n+1} = (-\gamma M \sum_{i=0}^n \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} \tau + v_0) \tau + \vec{r}_n$$

Полученные результаты



Тело движется в поле действия
второго тела

Координаты неподвижного тела	(0,0)
Начальные координаты подвижного тела	(100,100)
Начальная скорость	(10, 0)
Масса неподвижного тела	100000



Тело преодолело притяжение
второго тела
и удаляется от него

Координаты неподвижного тела	(0, 0)
Начальные координаты подвижного тела	(100, 100)
Начальная скорость	(100, 0)
Масса неподвижного тела	100000

Задачи, которые предстоит решить

В данный момент мы решаем, так называемую, задачу двух тел. Её формулировка следующая: даны два тела, их массы, начальные скорости и радиус-векторы. Между телами действует лишь сила гравитационного притяжения. Требуется отыскать зависимость положения обеих тел от времени.

Для решения данной задачи был выбран классический метод Рунге-Кутты четвертого порядка.

Задача двух тел

$$\angle n \cdot (c)^\wedge = \chi \cdot ((e)^\wedge - 1).$$
$$yz' - zy' = c_1, \quad zx' - xz' = c_2, \quad xy' - yx' = c_3$$

Решение задачи о двух телах



Поворот пространства

При аналитическом решении мы используем повороты пространства:

$i : \cos(i) = \frac{(\vec{c}, \vec{z})}{|\vec{c}|}$ - наклонение



Ω : угол между линией узлов и осью Ох

g : угол поворота Ох для совпадения с перицентром



Виды траекторий движения

Эллиптическая траектория движения тел



Гиперболическая траектория

Связь эксцентричной аномалии с истинной

Имеем выражение для истинной и эксцентричной аномалии:

Дифференцируем его:

Переписываем полученное выражение, где n константа для

средней аномалии:

Интегрируем полученное выражение, получаем (M – средняя аномалия):

Далее переписываем и решаем это уравнение просто рекуррентно с начальной подстановкой $E_0 = M$:

$$\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tg} \frac{E}{2}.$$

$$\dot{E} = \frac{\varkappa \sin \theta}{a^{3/2} \sqrt{1-e^2} \sin E} = \frac{\varkappa a^{-3/2}}{1-e \cos E},$$

$$(1-e \cos E) dE = n dt,$$

$$E - e \sin E = M,$$

$$M = n(t - T)$$

$$f(E) = M + e \sin E$$

Метод Рунге-Кутты

По своей сути, задача двух тел – один из случаев задачи Коши, рассмотренной ранее. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка – один из методов решения таких задач.

Метод Рунге-Кутты заключается в использовании следующей итерационной формулы (h – величина разбиения сетки):

Классический метод имеет четвёртый порядок точности. Это значит, что ошибка на каждом шаге имеет порядок $O(h^5)$, а суммарная ошибка на конечном интервале интегрирования имеет порядок $O(h^4)$

$$y' = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3)$$

Явные методы Рунге-Кутта

Семейство явных методов Рунге — Кутты является обобщением как явного метода Эйлера, так и классического метода Рунге — Кутты четвёртого порядка. h — величина разбиения сетки по x .

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i \cdot k_i$$

$$k_1 = f(x_n, y_n),$$

$$k_2 = f(x_n + c_2 h, y_n + a_{21} h k_1),$$

...

$$k_s = f(x_n + c_s h, y_n + a_{s1} h k_1 + a_{s2} h k_2 + \dots + a_{s,s-1} h k_{s-1})$$

Коэффициенты a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} можем найти по формулам из таблицы, приведенной справа. Такую упорядоченную таблицу называют таблицей Батчера.


0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
\vdots	\vdots	\vdots	\ddots		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	\dots	a_{ss-1}	
	b_1	b_2	\dots	b_{s-1}	b_s

Метод Рунге - Кутты с автоматическим выбором шага


Пусть $y(x, h)$ - приближенное значение решения с порядком точности p в точке x с шагом по сетке h . Тогда можно рассмотреть погрешность данного решения, используя приближенное решение с удвоенным шагом $y(x, 2h)$ того же порядка p . Выберем величину ε - положительный параметр, обозначающий погрешность:

$$\left| \frac{y(x, h) - y(x, 2h)}{2^{p-1}} \right| \leq \varepsilon$$

Для автоматического выбора шага в программе заранее задается значение ε , и на каждом шаге подбирают такое h , что выполняется данное выше неравенство.



$$h = 5 \cdot 10^{-4}$$



$$h = 1 \cdot 10^{-4}$$

пректирования траектории, ко-
торый сводит к минимуму (или
Оптимизация траектории
максимизирует) некоторую
меру производительности при
соблюдении набора
ограничений.

оптимизации траектории,
Прямої браузований зважа дієтическої
оптимизациї с ограниченными
параметрами.

2) Решить эту задачу
оптимизации.

Примеры прямых методов
Многократная стрельба –
ограничение дефекта на
множестве сегментов
изначальной области решения

Построение оптимальной
Планы на ближайшее время
траектории для тела,

начинающего движение от

Земли до Марса с учетом лишь

сил притяжения со стороны

Солнца.