

No-Spa Additional Slides for Backbone Pharma c1 2019_ukr

1.06.19 SAUA.DRT.18.12.1235b

НО-ШПА®

Спазмолітична активність по відношенню до
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО
тракту¹

ДРОТАВЕРИН*

+ + +

МЕБЕВЕРИН

+ +

ПАПАВЕРИН

+

ТРИМЕБУТИН

+


ДИЦЕТЕЛ

+ +

НО-ШПА®: ефективна при
спазмах гладкої мускулатури*

*Дротаверин є діючою речовиною лікарського засобу НО-ШПА®. Інструкція для медичного застосування препарату НО-ШПА®, таблетки по 40 мг. Наказ МОЗ України №887 від 01.08.2017. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/0391/01/02 від 01.08.2017 р.

1. Минускин О.Н., Функциональные расстройства кишечника и желчевыводящих путей. Лечебные подходы, выбор спазмолитика, журнал Лечащий врач, №2 2012, с.2



Динаміка відчуття
спастичного болю
при пальпації

НО-ШПА®: більш швидке зменшення абдомінального болю, викликаного спазмом при СПК^{1}**

*Дротаверин є діючою речовиною лікарського засобу НО-ШПА®. Препарат НО-ШПА®, таблетки по 40 мг. Наказ МОЗ України №887 від 01.08.2017. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/0391/01/02 від 01.08.2017 р.

** СПК – синдром подразненого кишечника

1. Бабак О.Я. Выбор спазмолитика для стартовой терапии при абдоминальной боли: непростой вопрос с универсальным ответом// Здоровье Украины. Тематический номер. – 2013. – С.8