

Ситуационная задача

Пациентка Д., 30 лет

- Поступила в приемный покой самостоятельно
- 10 минут назад, со слов мужа, ее укусила пчела
- Сознание отсутствует



Объективно

- Кожа бледно-синяя, холодный липкий пот
- Мышечные подергивания, зрачки расширены
- Тоны сердца ослаблены
- Пульс на лучевой артерии не определяется, на сонной артерии 140 в мин.
- АД = 40/? мм.рт.ст.
- Частота дыхания 35 в минуту, дыхание свистящее.

Что с больной?

ШО

К

Анафилактический шок

Угрожающая жизни, остро развивающаяся системная реакция сенсibilизированного организма на повторный контакт с аллергеном, сопровождающаяся нарушением гемодинамики, приводящая к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных органах






Что надо ввести больной в ПЕРВУЮ очередь?

- Допамин
- Атропин
- Норэпинефрин (Норадреналин)
- Пропранолол (Анаприлин)
- Эпинефрин (Адреналин)
- Лидокаин

Эпинефрин (Адреналин)!

- Адреналин 0,1% - 0,1-0,5 мл внутримышечно;
- При необходимости повторить инъекции через 5-20 мин
- Суммарная доза не должна превышать 2 мл




<http://www.cito03.ru/recomendaciya/smp/allerg.pdf>

Адреномиметики прямого действия

$\alpha_{1,2}$ $\beta_{1,2}$	α	β
Эпинефрин (Адреналин)	$\alpha_{1,2}$ β_1 Норэпинефрин (Норадреналин) α_1 Фенилэфрин α_2 Нафазолин Ксилометазолин Клонидин Тизанидин Гуанфацин Метилдофа	$\beta_{1,2}$ Изопреналин Орципреналин β_1 Дофамин Добутамин β_2 Сальбутамол Фенотерол Тербуталин Гексопреналин


Механизм действия



Кроме того

- Проводим терапию системными глюкокортикоидами
- Инфузионная терапия физиологическим раствором





Средства само- и взаимопомощи

