



Аурухана ішілік жұқпалы аурулар



АІЖА-кез-келген клиникалық жағдайда анықталатын ауру.
Ауруханаға түскенде немесе медициналық көмек көрсету кезінде
науқасқа жұғуы мүмкін аурудың бұл белгілері науқастың
ауруханаға түскен кезінде немесе емделіп шығып кеткеннен кейін
болуы мүмкін



АІЖА таралуының басты көзі

Қызметкерлердің қолы;


Ішек және несеп жолдары, мұрын қуысы, тері,
шаш, ауыз қуысы;

Қоршаған орта: қызметкерлер, шаң, су,
азық-түлік;

Медициналық әртүрлі құралдар;

Аппараттар

Дәрі-дәрмектер және т.б.



АІЖА қоздырғыштары

АІЖА-ды тудыратын:

Микроорганизмдер,
балалардың қызылша,
скарлатин, В мен С сары
ауруы, шартты-патогендік
микрофлор және басқа
көптеген аурулар да кіреді.

Патогенді микрофлораға
жататындар:

стафилококк, жылтырақ
алтын түстес стафилококк,
стрептококктар, көкіріңді
таяқшалар,
грамотрицательдік бактерия
және осылардың токсиндері.

АІЖА-дың негізгі қонақтайтын жерлері

❖ *Адам ағзасындағы негізгі қонақтайтын орындар:*

тері және жұмсақ ұлпалар, несеп жүретін жолдар, ауыз қуысы, мұрын қуысы, қынап, ішек.

❖ *Медициналық мекемелерде – резеңкеден жасалған бұйымдар*

❖ *Қызметкерлердің қолымен:*

алтын түстес жылтырақ стафилококк, эпидермиальды стафилакокк, А стерептококкі, энтерококк, эшерихт, клеб-сиела, энтеробактерия, протей, сальмонел, көкірінді таяқша, полиомиелит, «А» сары ауруы.

АІЖА-дың берілу механизмі:

- ❖ Аэрозольды (ауадағы тамшы)
 - ❖ Тұрмыстық қарым-қатынаста
 - ❖ Қолдан жасалған, жасанды (артифициальный)
 - ❖ Қанмен жұмыс істеу кезінде
 - ❖ Биологиялық сұйықтықтармен қатынаста
- 