СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ

Пусть точка М движется относительно системы отсчета $OXYZ$, которая в свою очередь, движется относительно неподвижной системы отсчета $O_1X_1Y_1Z_1$. Такое движение точки М называется составным или сложным.



- Движение точки М относительно неподвижной системы отсчета $O_1X_1Y_1Z_1$ называется абсолютным, а траектория, скорость и ускорение точки М в этом движении – абсолютными.
  - Обозначения: $(\vec{V}_{абс}, \vec{a}_{абс})$ $(\vec{\ }, \vec{\ })$.
- Движение точки М относительно подвижной системы отсчета $OXYZ$ называется относительным, а траектория, скорость и ускорение точки М в этом движении – относительными.
  - Обозначения: $(\vec{V}_{отн}, \vec{a}_{отн})$ $(\vec{\ }_r, \vec{\ }_r)$.
- Движение точки М вместе с подвижной системой отсчета $OXYZ$ относительно неподвижной системы отсчета $O_1X_1Y_1Z_1$ называется переносным, а скорость и ускорение той точки подвижной системы отсчета $OXYZ$, с которой совпадает движущаяся точка М в данный момент времени – переносными.
  - Обозначения: $(\vec{V}_{пер}, \vec{a}_{пер})$ $(\vec{\ }_e, \vec{\ }_e)$.
- Основной задачей кинематики сложного движения точки является установление зависимостей между скоростями и ускорениями абсолютного, относительного и переносного движений.

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНЫЕ ВЕКТОРА



Пусть вектор $\vec{a}$ задан в подвижной системе отсчета $OXYZ$: $\vec{a}(t) = a_x(t)\cdot\vec{i} + a_y(t)\cdot\vec{j} + a_z(t)\cdot\vec{k}$.

Определим правило нахождения производной этого вектора в неподвижной системе отсчета $O_1X_1Y_1Z_1$ – (абсолютной производной), учитывая, что единичные векторы $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ меняют свое направление вследствие движения подвижной системы отсчета $OXYZ$.

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{da_x}{dt}\vec{i} + \frac{da_y}{dt}\vec{j} + \frac{da_z}{dt}\vec{k} + a_x\frac{d\vec{i}}{dt} + a_y\frac{d\vec{j}}{dt} + a_z\frac{d\vec{k}}{dt}$$

Обозначим $\frac{da_x}{dt}\vec{i} + \frac{da_y}{dt}\vec{j} + \frac{da_z}{dt}\vec{k} = \frac{\tilde{d}\vec{a}}{dt}$ – относительная производная вектора $\vec{a}$.

По формуле Эйлера $\frac{d\vec{i}}{dt} = \vec{\omega}\times\vec{i}$, $\frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{\omega}\times\vec{j}$, $\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega}\times\vec{k}$, поэтому выражение

$a_x\frac{d\vec{i}}{dt} + a_y\frac{d\vec{j}}{dt} + a_z\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega}\times(a_x\cdot\vec{i} + a_y\cdot\vec{j} + a_z\cdot\vec{k}) = \vec{\omega}\times\vec{a}$. Окончательно получим: $\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{\tilde{d}\vec{a}}{dt} + \vec{\omega}\times\vec{a}$.

Абсолютная производная вектора равна сумме относительной производной и векторного произведения угловой скорости подвижной системы отсчета на этот вектор.

ТЕОРЕМА О СЛОЖЕНИИ СКОРОСТЕЙ



Пусть точка М движется относительно подвижной системы отсчета $OXYZ$, которая совершает произвольное движение относительно неподвижной системы отсчета $O_1X_1Y_1Z_1$. Положение точки М в подвижной системе отсчета задается радиусом – вектором $\vec{r}$, а в неподвижной системе отсчета радиусом – вектором $\vec{\rho}$. Положение начала подвижной системы отсчета задается радиусом – вектором $\vec{\rho}_O$. Тогда:

$$\forall t > 0,\ \vec{\rho} = \vec{\rho}_O + \vec{r},\ \vec{r} = x\cdot\vec{i} + y\cdot\vec{j} + z\cdot\vec{k}.$$

Вектор абсолютной скорости точки **М:** $\vec{V} = \dfrac{d\vec{\rho}}{dt} = \dfrac{d\vec{\rho}_O}{dt} + \dfrac{d\vec{r}}{dt}$,

где $\dfrac{d\vec{\rho}_O}{dt} = \vec{V}_O$ - скорость начала подвижной системы отсчета.

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{\omega}_{пер}\times\vec{r},\quad \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = \vec{V}_{отн}.$$

$$\vec{V} = \vec{V}_{отн} + \vec{V}_{пер} + \vec{\omega}_{пер}\times\vec{r}\ (*)$$ Переносную скорость точки М можно получить из (*) , если зафиксировать положение точки в подвижной системе отсчета: положить $\vec{r} = const$:

$\vec{V}_{пер} = \vec{V}_O + \vec{\omega}_{пер}\times\vec{r}$. Заметим, что это скорость точки свободного твердого тела.

Окончательно $\vec{V} = \vec{V}_{пер} + \vec{V}_{отн}$ $(при\ \vec{\omega}_{пер} = 0,\ \vec{V}_{пер} = \vec{V}_O)$.

Абсолютная скорость точки равна векторной сумме переносной и относительной скорости.

ПРИМЕР 1



ТЕОРЕМА О СЛОЖЕНИИ УСКОРЕНИЙ (ТЕОРЕМА КОРИОЛИСА)

Для нахождения абсолютного ускорения точки М продифференцируем по времени выражение (*) учитывая, что векторы $\vec{V}_{отн}$ и $\vec{r}$ заданы в подвижной системе отсчета.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{V}_{отн}}{dt} + \frac{d\vec{V}_O}{dt} + \frac{d\vec{\omega}_{пер}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega}_{пер} \times \frac{d\vec{r}}{dt},$$ где

$\frac{d\vec{V}_O}{dt} = \vec{a}_O$ - ускорение начала подвижной системы отсчета; $\frac{d\vec{\omega}_{пер}}{dt} \times \vec{r} = \vec{\varepsilon}_{пер} \times \vec{r}$;

$$\frac{d\vec{V}_{отн}}{dt} = \frac{d\vec{V}_{отн}}{dt} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k} +$$

$$+\vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн} = \vec{a}_{отн} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн};$$

$$\vec{\omega}_{пер} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega}_{пер} \times \left(\frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{r}\right) = \vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{пер} \times \vec{r}.$$

$$\vec{a} = \vec{a}_{пер} + \vec{\varepsilon}_{пер} \times \vec{r}_{пер} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{пер} \times \vec{r}_{отн} + \vec{a}_{отн} + 2 \cdot (\vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн}) \quad (**).$$

Переносное ускорение точки М можно получить из выражения (**) положив в нем $\vec{r} = const$:

$$\vec{a}_{пер} = \vec{a}_O + \vec{\varepsilon}_{пер} \times \vec{r} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{пер} \times \vec{r} \quad (\vec{\omega}_{пер} = \vec{\varepsilon}_{пер} = 0, \ \vec{a}_{пер} = \vec{a}_O)$$

ТЕОРЕМА О СЛОЖЕНИИ УСКОРЕНИЙ (ТЕОРЕМА КОРИОЛИСА)

Слагаемое $2\cdot(\vec{\omega}_{пер}\times\vec{V}_{отн})=\vec{a}_{кор}$ называется Кориолисовым (поворотным) ускорением.

Окончательно получим: $\vec{a}=\vec{a}_{пер}+\vec{a}_{отн}+\vec{a}_{кор}$.

Теорема Кориолиса

Абсолютное ускорение точки равно векторной сумме ее переносного, относительного и Кориолисова ускорений.

- ✔ относительное ускорение точки характеризует изменение относительной скорости в относительном движении;
- ✔ переносное ускорение точки характеризует изменение переносной скорости в переносном движении;
- ✔ ускорение Кориолиса характеризует изменение относительной скорости точки в переносном движении и переносной скорости точки в относительном движении.
  Оно возникает вследствие взаимного влияния движений, в которых участвует точка.

ВЫЧИСЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ КОРИОЛИСА ПРАВИЛО ЖУКОВСКОГО

Модуль ускорения Кориолиса вычисляется по правилу нахождения модуля векторного произведения векторов:

$$\left|\vec{a}_{кор}\right| = 2 \cdot \left|\vec{\omega}_{пер}\right| \cdot \left|\vec{V}_{отн}\right| \cdot \sin(\vec{\omega}_{пер} \hat{} \vec{V}_{отн}) .$$

Из данной формулы следует, что ускорение Кориолиса обращается в нуль в следующих случаях:

а) $\vec{\omega}_{пер} = 0$ - подвижная система отсчета совершает поступательное движение;

б) $\vec{V}_{отн} = 0$ - точка находится в покое в подвижной системе отсчета;

в) $\sin(\vec{\omega}_{пер} \hat{} \vec{V}_{отн}) = 0$ - векторы $\vec{\omega}_{пер}$ и $\vec{V}_{отн}$ коллинеарны.

Правило Жуковского

Для определения направления ускорения Кориолиса необходимо:

- спроектировать вектор относительной скорости точки на плоскость, перпендикулярную вектору угловой скорости переносного вращательного движения и
- повернуть проекцию в ее плоскости на угол 90^0 в сторону переносного вращения



ПРИМЕР 2



Дано:

OM = s(t) = 4t - t^2 (м);

φ(t) = $t^2 - 3t$ (рад);

t_1 = 1c .

Найти:

V(t_1) = ? , a (t_1) = ?

Решение

1) OM = s(t_1) = 4·1 – 1^2 = 3 (м);

2) По теореме о сложении скоростей:

$$\vec{V} = \vec{V}_{ПЕР} + \vec{V}_{ОТН}$$

$|\vec{V}_{ПЕР}| = \omega_{ПЕР} \cdot OM$, $\vec{V}_{ПЕР} \perp$;

$$\omega_{ПЕР} = \frac{d\varphi}{dt} = 2 \cdot t - 3,\ \omega_{ПЕР}(t_1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1 (c^{-1}),$$

$$|\vec{V}_{ПЕР}| = |\omega_{ПЕР}| \cdot \quad = 1 \cdot 3 = 3 \left(м/с \right);$$

$$V_{ОТН} = \frac{ds}{dt} = 4 - 2 \cdot t;\ V_{ОТН}(1) = 4 - 2 \cdot 1 = 2 \left(м/с \right).$$

$\vec{V}_{ОТН} \perp \vec{V}_{ПЕР}$, поэтому $|\vec{V}| = \sqrt{|\vec{V}_{ОТН}|^2 + |\vec{V}_{ОТН}|^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = 3{,}6 \left(м/с \right)$



ПРИМЕР 2 (продолжение)



По теореме о сложении ускорений:

$$\vec{a} = \vec{a}^{\tau}_{ОТН} + \vec{a}^{n}_{ОТН} + \vec{a}^{\tau}_{ПЕР} + \vec{a}^{n}_{ПЕР} + \vec{a}_{КОР}.$$

$$a^{\tau}_{ОТН} = \frac{dV_{ОТН}}{dt} = -2\left(м/с^2\right);$$

$$a^{n}_{ОТН} = \frac{V^2_{ОТН}}{\rho_{ОТН}} = 0$$ т.к. траектория относительного движения - прямая линия;

$$\left|\vec{a}^{\tau}_{ПЕР}\right| = \varepsilon \cdot OM, \quad \vec{a}^{\tau}_{ПЕР} \perp OM;$$

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = 2(c^{-2});$$

$$\left|\vec{a}^{\tau}_{ПЕР}\right| = 2 \cdot 3 = 6\left(м/с^2\right);$$

$$\left|\vec{a}^{n}_{ПЕР}\right| = \omega^2 \cdot OM = (-1)^2 \cdot 3 = 3\left(м/с^2\right);$$

$$a_{ОТН} = -a^{\tau}_{ПЕР} - a^{n} = -2 - 3 = -5\left(м/с^2\right),$$

$$a_{ПЕР} = a^{\tau}_{КОР} = a = 6 - 4 = 2\left(м/с^2\right),$$

$$\left|\vec{a}\right| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = 5{,}39\left(м/с^2\right).$$

$$\left|\vec{a}_{КОР}\right| = 2 \cdot \left|\vec{\omega}\right| \cdot \left|\vec{V}_{ОТН}\right| \cdot \sin(\vec{\omega}\,\hat{}\,\vec{V}_{ОТН}) = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4\left(м/с^2\right).$$

Ответ: V=3,6$\left(м/с\right)$; $a = 5{,}39\left(м/с^2\right)$.

ПРИМЕР 3

$R = 0.6$; $м = 0.8$;

$\varphi(t) = 3t^2 - 8t$;

$s(t) = AM = \frac{\pi}{3} R(2t^2 - t^3)$.

$t_1 = 1c$

$V_{АБС}(t_1) = ?$;

$a_{АБС}(t_1) = ?$.



Решение

1. Определим положение точки М на диске в момент **t1**.

$$\begin{cases} S(t_1) = \frac{\pi}{3} R(2 \cdot 1^2 - 1^3) = \frac{\pi}{3} R \\ S = R\alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$



ПРИМЕР 3 (продолжение)

2. Абсолютную скорость точки найдем по теореме о сложении скоростей:



$$\vec{V}_{АБС} = \vec{V}_{ПЕР} + \vec{V}_{OTH}$$

$$\left|\vec{V}_{ПЕР}\right| = V_{ПЕР} = \omega_{ПЕР} \cdot OM, \quad \vec{V}_{ПЕР} \perp OM$$

$$OM = \sqrt{L^2 + R^2 - 2LR\cos 120^0} =$$

$$= \sqrt{0.8^2 + 0.6^2 + 2 \cdot 0.8 \cdot 0.6 \cdot 0.5} = \sqrt{1.48} = 1.22 м$$

$$\omega_{ПЕР} = \dot{\varphi} = 6t - 8 \; ; \; \omega_{ПЕР}(t_1) = 6 \cdot 1 - 8 = -2 c^{-1}$$

$$\left|\vec{V}_{пер}\right| = \left|\omega_{пер}\right| \cdot OM = 2 \cdot 1.22 = 2.44 \quad м/с$$

$$V_{отн} = \frac{dS}{dt} = \frac{\pi R}{3}(4t - 3t^2); \; V_{отн}(t_1) = 0.63 \quad м/с$$

ПРИМЕР 3 (продолжение)

$$V_{Xер} = V_{отн} \sin\beta - V \sin\alpha ,$$

$$V_{Yер} = -V_{отн} \cos\beta + V \cos\alpha .$$



$$\begin{cases} \sin\beta = \dfrac{R\sin\alpha}{OM} = \dfrac{0.6\cdot 0.866}{1.22} = 0.43; \\ \cos\beta = \dfrac{R\cos\alpha + L}{OM} = \dfrac{0.6\cdot 0.5 + 0.8}{1.22} = 0.9. \end{cases}$$

$$V_X = 2.44\cdot 0.43 - 0.63\cdot 0.866 = 0.5$$

$$V_Y = -2.44\cdot 0.9 + 0.63\cdot 0.5 = -1.88$$

$$\left|\vec{V}_{абс}\right| = \sqrt{V_X^2 + V_Y^2} = \sqrt{0.5^2 + 1.88^2} = 1.95 \quad /$$

ПРИМЕР 3 (продолжение)

3. Абсолютное ускорение точки определим по теореме Кориолиса:

$$\vec{a}_{абс} = \vec{a}_{пер} + \vec{a}_{отн} + \vec{a}_{кор}$$

$$\vec{a}_{пер} = \vec{a}^{\tau}_{пер} + \vec{a}^{n}_{пер}$$



$$\left|\vec{a}^{\tau}_{пер}\right| = \left|\varepsilon_{пер}\right| OM\,, \quad \left|\vec{a}^{n}_{пер}\right| = \omega^2_{пер} OM$$

$$\varepsilon_{пер} = \dot{\omega}_{пер} = 6 \text{ рад/с}^2, \quad \varepsilon_{пер}(t_1) = 6 \cdot 1 = 6$$

$$\left|\vec{a}^{\tau}_{пер}\right| = 6 \cdot 1.22 = 7.32 \text{ м/с}^2; \quad \left|\vec{a}^{n}_{пер}\right| = 2^2 \cdot 1.22 = 4.88 \text{ м/с}^2.$$

$$a^{\tau}_{отн} = \frac{dV_{отн}}{dt} = \frac{\pi R}{3}(4 - 6t); \quad a^{\tau}_{отн}(t_1) = \frac{\pi R}{3}(4 - 6 \cdot 1) = -1.26 \text{ м/с}^2$$

$$a^{n}_{отн} = \frac{V^2_{отн}}{\rho_{отн}} = \frac{V^2_{отн}}{R} = \frac{0.63^2}{0.6} = 0.66 \text{ м/с}^2$$

ПРИМЕР 3 (продолжение)

$$\vec{a}_{кор} = 2(\vec{\omega}_{пер} \times \vec{V}_{отн})$$

$$\left|\vec{a}_{кор}\right| = 2\left|\vec{\omega}_{пер}\right| \cdot \left|\vec{V}_{отн}\right| \sin(\vec{\omega}_{пер}\hat{}, \vec{V}_{отн}) =$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 0.63 \cdot \sin 90^0 = 2.52 м/с^2$$



$$\vec{a} = \vec{a}^{\tau}_{пер} + \vec{a}^{n}_{пер} + \vec{a}^{\tau}_{отн} + \vec{a}^{n}_{отн} + \vec{a}_{кор}$$

$$a_x = -a^{\tau}_{пер}\sin\beta - a^{n}_{пер}\cos\beta + a^{\tau}_{отн}\sin\alpha - a^{n}_{отн}\cos\alpha + a_{кор}\cos\alpha =$$

$$= -7.32 \cdot 0.43 - 4.88 \cdot 0.9 + 1.26 \cdot 0.866 - 0.66 \cdot 0.5 + 2.52 \cdot 0.5 = -5.52$$

$$a_y = a^{\tau}_{пер}\cos\beta - a^{n}_{пер}\sin\beta - a^{\tau}_{отн}\cos\alpha - a^{n}_{отн}\sin\alpha + a_{кор}\sin\alpha =$$

$$= 7.32 \cdot 0.9 - 4.88 \cdot 0.43 - 1.26 \cdot 0.5 - 0.66 \cdot 0.866 + 2.52 \cdot 0.866 = 5.47$$

$$\left|\vec{a}\right| = \sqrt{a_X^2 + a_Y^2} = \sqrt{5.52^2 + 5.47^2} = 7.77 \quad м/с^2$$

ПРИМЕР 4

$R = 0.6$; $L = 0.8$;

$\varphi(t) = 3t^2 - 8t$;

$s(t) = AM = \frac{\pi}{3} R(2t^2 - t^3)$.

$t_1 = 1c$

$V_{АБС}(t_1) = ?$;

$a_{АБС}(t_1) = ?$.



Относительное движение остается прежним.

$|V_{пер}| = |\omega_{пер}| \cdot KM$, $V_{пер} \perp$

$KM = L + R\cos\alpha = 0.8 + 0.6 \cdot 0.5 = 1.1$

$|V_{пер}| = 2 \cdot 1.1 = 2.2$ / ; $V_{пер} \perp V_{отн}$

$|V_{абс}| = \sqrt{|V_{пер}|^2 + |V_{отн}|^2} = \sqrt{2.2^2 + 0.63^2} = 2.28$ /



ПРИМЕР4 (продолжение)



2. Переносное ускорение

$$\left|\vec{a}^{\tau}_{пер}\right| = \left|\varepsilon_{пер}\right| KM = 6 \cdot 1.1 = 6.6 \quad м/с^2$$

$$\left|\vec{a}^{n}_{пер}\right| = \omega^2_{пер} \cdot KM = 2^2 \cdot 1.1 = 4.4 \quad м/с^2$$

3. Ускорение Кориолиса

$$\left|\vec{a}_{кор}\right| = 2 \cdot \left|\vec{\omega}_{пер}\right| \cdot \left|\vec{V}_{отн}\right| \sin(\vec{\omega}_{пер}, \vec{V}_{отн})$$

$$\left|\vec{a}_{кор}\right| = 2 \cdot \left|\vec{\omega}_{пер}\right| \cdot \left|\vec{V}_{отн}\right| \sin 120^0 =$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 0.63 \cdot 0.866 = 2.18 \, м/с^2$$

$$a_{X_{отн}} = -a^n \cos\alpha_{пер} - a^n_{отн} + a^{\tau} \sin\alpha = -0.66 \cdot 0.5 - 4.4 + 1.26 \cdot 0.866 = -3.64 \quad м/с^2,$$

$$a_{Y_{отн}} = -a^n \sin\alpha_{отн} - a^{\tau} \cos\alpha = -0.66 \cdot 0.866 - 1.26 \cdot 0.5 = 1.2 \quad м/с^2,$$

$$a_{Z_{пер}} = -a^{\tau}_{кор} - a = -6.6 - 2.18 = -8.78 \quad м/с^2.$$

$$\left|\vec{a}_{абс}\right| = \sqrt{a_X^2 + a_Y^2 + a_Z^2} = \sqrt{3.64^2 + 1.2^2 + 8.78^2} = 9.58 \quad м/с^2$$

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Никола́й Его́рович Жуко́вский
(5 (17) января 1847 с. Орехово,
ныне Владимирской области –
17 марта 1921, Москва)

Русский ученый-механик, создатель аэродинамики как науки. Заслуженный профессор Московского университета, профессор теоретической механики Императорского Московского технического училища (с 1918 г. — МВТУ). В 1894 г. Жуковский был избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду математических наук . При его активном участии были созданы Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Московский авиатехникум (Военно-воздушная академия).

Гюстав Гаспар Кориолис
(Coriolis G.G., 21.05.1792 – 19.09.1843)

Родился в Париже в 1792г.

В 1810 г. окончил Политехническую школу, а в 1812 г. Школу мостов и дорог. С 1816 г. начал преподавать в Политехнической школе, где вскоре стал профессором, а в 1831 г. – директором учебной части школы. Преподавал также в Центральной школе искусств и ремесел и в Школе мостов и дорог. В 1836 г. был избран в Парижскую академию наук