

АЛГЕБРА

УРОК НА ТЕМУ: СВОЙСТВА КОРНЯ N-ОЙ СТЕПЕНИ.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Корень n-ой степени.

Ребята, мы продолжаем изучать корни n-ой степени из действительного числа. Как и практически все математические объекты корни n-ой степени обладают некоторыми свойствами, сегодня мы и займемся изучением этих свойств.

Все свойства, которые мы с вами рассмотрим, формулируются и доказываются только для неотрицательных значений переменных, содержащихся под знаком корня.

Однако заметим, *в случае нечетного показателя корня они выполняются и для отрицательных переменных.*

$$\sqrt[n]{a}$$

$$\sqrt[n]{b}$$

Корень n-ой степени.

Теорема1.

Корень n-ой степени из произведения двух неотрицательных чисел равен произведению корней n-ой степени этих чисел:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Корень n-ой степени.

Теорема2.

Если $a \geq 0$, $b > 0$ и n – натуральное число, большее одного тогда выполняется следующее равенство:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

То есть корень n-ой степени частного равен частному корней n-ой степени.

Корень n-ой степени.

Пример. Вычислить

$$\sqrt[4]{16 \cdot 81 \cdot 256}$$

Решение. Воспользуемся теоремой 1

$$\sqrt[4]{16 \cdot 81 \cdot 256} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[4]{256} = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

Пример. Вычислить $\sqrt[5]{7\frac{19}{32}}$

Решение. Представим подкоренное выражение в виде неправильной дроби:

$$7\frac{19}{32} = \frac{7 \cdot 32 + 19}{32} = \frac{243}{32}$$

Воспользуемся теоремой 2:

$$\sqrt[5]{\frac{243}{32}} = \frac{\sqrt[5]{243}}{\sqrt[5]{32}} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

Корень n-ой степени.

Пример. Вычислить

а) $\sqrt[4]{24} \cdot \sqrt[4]{54}$

б) $\sqrt[6]{256} : \sqrt[6]{4}$

Решение.

а) $\sqrt[4]{24} \cdot \sqrt[4]{54} = \sqrt[4]{24 \cdot 54} = \sqrt[4]{8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 27} = \sqrt[4]{16 \cdot 81} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81} = 2 \cdot 3 = 6$

б) $\sqrt[6]{256} : \sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{\frac{256}{4}} = \sqrt[6]{64} = 2$

Корень n-ой степени.

Теорема 3.

Если $a \geq 0$, k – натуральное число и n – натуральное число, больше 1, то справедливо равенство:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^k = \sqrt[n]{a^k}$$

Чтобы возвести корень в натуральную степень, достаточно возвести в эту степень подкоренное выражение.

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^3 = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot a \cdot a} = \sqrt[n]{a^3}$$

Корень n-ой степени.

Теорема 4.

Если $a \geq 0$, n, k – натуральные числа, большие одного, то справедливо равенство:

$$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[n \cdot k]{a}$$

Чтобы извлечь корень из корня, достаточно перемножить показатели корней.

Пример.

$$\sqrt[3]{\sqrt[5]{a}} = \sqrt[15]{a}$$

$$\sqrt[4]{\sqrt{a}} = \sqrt[8]{a}$$

$$\sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt[4]{a}$$

Корень n-ой степени.

Теорема 5.

Если показатели корня и подкоренного выражения умножить на одно и тоже натуральное число, то значение корня не изменится:

$$\sqrt[n \cdot p]{a^{k \cdot p}} = \sqrt[n]{a^k}$$

Корень n-ой степени.

Примеры:

$$\sqrt[15]{a^5} = \sqrt[5]{a} \text{ (разделили показатели на 5)}$$

$$\sqrt[24]{a^{22}} = \sqrt[12]{a^{11}} \text{ (разделили показатели на 2)}$$

$$\sqrt[3]{a^4} = \sqrt[9]{a^{12}} \text{ (умножили показатели на 3)}$$

Пример. Выполнить действия:

$$\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[3]{a}$$

Решение.

Показатели корней разные числа, поэтому мы не можем воспользоваться теоремой 1, но воспользовавшись теоремой 5 мы можем получить равные показатели.

$$\sqrt[4]{a} = \sqrt[12]{a^3} \text{ (умножили показатели на 3)}$$

$$\sqrt[3]{a} = \sqrt[12]{a^4} \text{ (умножили показатели на 4)}$$

$$\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[3]{a} = \sqrt[12]{a^3} \cdot \sqrt[12]{a^4} = \sqrt[12]{a^3 \cdot a^4} = \sqrt[12]{a^7}$$

Корень n-ой степени.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Вычислить $\sqrt[5]{32 \cdot 243 \cdot 1024}$

2. Вычислить $\sqrt[4]{7\frac{58}{81}}$

3. Вычислить
а) $\sqrt[3]{81} \cdot \sqrt[3]{72}$

б) $\sqrt[5]{1215} : \sqrt[5]{5}$

4. Упростить:

а) $\sqrt[8]{\sqrt[3]{a}}$

б) $\sqrt[5]{\sqrt{a}}$

в) $\sqrt{\sqrt[9]{a}}$

5. Выполнить действия:

$$\sqrt[7]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^4}$$