



# Тригонометрические функции


## Синус и косинус





если  $M(t) = M(x; y)$ , то

$$x = \text{cost}, y = \text{sint}$$




$$-1 \leq x \leq 1; -1 \leq y \leq 1$$

$$-1 \leq \sin t \leq 1, -1 \leq \cos t \leq 1$$



# Таблица знаков синуса и косинуса

	I четверть	II четверть	III четверть	IV четверть
<b>cost</b>	+	-	-	+
<b>sint</b>	+	+	-	-


$$x^2 + y^2 = R^2$$

при  $R = 1$


$$x^2 + y^2 = 1$$

– уравнение единичной окружности

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

# Таблица значений синуса и косинуса


<b>t</b>	<b>0</b>	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
<b>cost</b>	<b>1</b>	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	<b>0</b>
<b>sint</b>	<b>0</b>	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	<b>1</b>



$$\sin(-t) = -\sin t$$

$$\cos(-t) = \cos t$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$




$$\sin(t + \pi) = -\sin t$$

$$\cos(t + \pi) = -\cos t$$

$$\sin \frac{7\pi}{6} = \sin \left( \frac{\pi}{6} + \pi \right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{5\pi}{4} = \cos \left( \frac{\pi}{4} + \pi \right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$





$$\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos t$$

$$\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin t$$

Вычислить  $\text{Sint}$  и  $\text{Cost}$ , если:

$$t = \frac{45\pi}{4}; t = -\frac{37\pi}{3}; t = 45\pi; t = -18$$

$$\frac{45\pi}{4} = \frac{45}{4} \cdot \pi = \left(10 + \frac{5}{4}\right) \cdot \pi = 10\pi + \frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} + 2\pi \cdot 5$$


$$\sin \frac{45\pi}{4} = \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{45\pi}{4} = \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{37\pi}{3} = -\frac{37}{3} \cdot \pi = -\left(12 + \frac{1}{3}\right) \cdot \pi = -12\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot (-6)$$

$$\sin\left(-\frac{37\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{37\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$$



$$45\pi = 44\pi + \pi = \pi + 2\pi \cdot 22$$

$$\sin 45\pi = \sin \pi = 0; \cos 45\pi = \cos \pi = -1$$

$$-18\pi = 0 + 2\pi \cdot (-9)$$

$$\sin(-18\pi) = \sin 0 = 0; \cos(-18\pi) = \cos 0 = 1$$

Решить уравнение  $\sin t = \frac{1}{2}$



$$t = \frac{\pi}{6} + 2\pi k; t = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$$