



Подготовила студентка группы  
17

- Гнойничковые заболевания кожи — это многочисленная группа болезней, вызванных стафилококками, стрептококками или смешанной флорой.


Распространенность данной патологии очень высока.

- В течение жизни с пиодермией сталкивается практически каждый человек.
- Инфекция может распространяться на суставы и кости. В тяжелых случаях микробы попадают в кровоток и нарушают функцию внутренних органов.
- Пиодермия у детей и взрослых бывает первичной и вторичной. В первом случае она развивается самостоятельно. Вторичная форма бывает осложнением других болезней: чесотки, сахарного диабета, экземы.

Гнойники на теле у детей и взрослых образуются по разным причинам. Наибольшее значение имеют следующие предрасполагающие факторы:

- наличие чесотки;
- снижение иммунитета;
- переохлаждение;
- вирусные заболевания;
- переутомление;
- наличие сахарного диабета;
- хронические заболевания почек и сердца;
- очаги хронической инфекции;
- несоблюдение личной гигиены;
- микротравмы кожи;
- злокачественные опухоли;
- облучение или проведение химиотерапии;
- аутоиммунные болезни;
- кахексия;
- гиповитаминоз;
- перегревание;
- ожирение.

POSTULA




# МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

- Лечение гнойничковых заболеваний при отсутствии осложнений и удовлетворительном состоянии проводится в амбулаторных условиях. В тяжелых случаях необходима госпитализация в учреждение, укомплектованное медицинским оборудованием для решений данной задачи. Лечебная тактика определяется формой пиодермии.

# ПРОФИЛАКТИКА

- Соблюдайте следующие правила:
- 

- После посещения тренажёрного зала протирайте антисептиком места, соприкасавшиеся с инвентарём.
  - Обрабатывайте порезы и ранки антибактериальными препаратами (йод, салициловый спирт, перекись водорода) сразу после возникновения.
  - Не делите предметы гигиены, косметику с другими людьми.
  - Места гнойников, импетиго нельзя мыть водой, расчёсывать, надавливать.
  - Избегайте острой жирной еды, сладостей.
- 

# Стафилодермия

Стафилодермия – группа пиодермий бактериальной этиологии, вызываемых микроорганизмами из группы стафилококка. Симптомы этого состояния и их выраженность различаются в зависимости от формы кожного поражения, типа реактивности организма, наличия сопутствующих нарушений (снижения активности иммунитета, повреждений кожи).

