


Карбоновые Кислоты.





Задание

- Составить опорный конспект используя учебник или презентацию .
- Основные разделы:
- А) строение и функциональная группа
- Б) номенклатура (несколько примеров)
- В) физические свойства

Кислородсодержащие органические соединения

Кислородсодержащие органические соединения

Спирты

-
одноатомные
-
многоатомны
е

Альдегиды
и кетоны

Карбоновые
кислоты

Эфиры
-простые
-сложные

Углеводы




Задачи

1. Выяснить функциональную группу, общую формулу карбоновых кислот.
2. Сформулировать определение.
3. Изучить классификацию карбоновых кислот.
4. Овладеть навыками номенклатуры.
5. Рассмотреть физические и химические свойства наиболее важных карбоновых кислот.
6. Выяснить области применения некоторых карбоновых кислот.

Все карбоновые кислоты имеют **функциональную группу**


Карбонильная группа




Гидроксильная группа

Карбоксильная группа

Общая формула



Или для предельных одноосновных кислот



? Что называется карбоновыми кислотами?

Карбоновые кислоты- это органические соединения, молекулы которых содержат карбоксильную группу – COOH, связанную с углеводородным радикалом.


? Каким образом генетически карбоновые кислоты связаны с ранее изученным классом альдегидов?



Классификация карбоновых кислот

В зависимости от числа карбоксильных групп


Одноосновные
(уксусная)



Двухосновные
(щавелевая)




Многоосновные
(лимонная)



В зависимости от природы радикала


Предельные
(пропионовая)



Непредельные
(акриловая)



Ароматические
(бензойная)



По содержанию атомов С: С₁-С₉- низшие, С₁₀и более - высшие


Проклассифицируйте предложенные кислоты




1. Одноосновная, предельная, низшая




2. Двухосновная, предельная, низшая



3. Одноосновная, предельная, низшая




4. Одноосновная,
непредельная, высшая



5. Многоосновная,
предельная, низшая


НОМЕНКЛАТУРА КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

АЛКАН + $\overset{\frown}{\text{ОВ}}$ + АЯ КИСЛОТА



МЕТАНОВАЯ КИСЛОТА
(МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА)






ЭТАНОВАЯ КИСЛОТА
(УКСУСНАЯ КИСЛОТА)




БУТАНОВАЯ КИСЛОТА
(МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА)



ПЕНТАНОВАЯ КИСЛОТА

(ВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА)



ЭТАНДИОВАЯ КИСЛОТА

(ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА)


Гомологический ряд карбоновых кислот

Химическая формула	Систематическое название кислоты	Тривиальное название кислоты	Название кислотного остатка
HCOOH	Метановая	Муравьиная	Формиат
CH_3COOH	Этановая	Уксусная	Ацетат
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	Пропановая	Пропионовая	Пропионат
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	Бутановая	Масляная	Бутират
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	Пентановая	Валериановая	валеринат
$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$	Гексановая	Капроновая	капронат
$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-\text{COOH}$	Декановая	каприновая	капринат
$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{14}-\text{COOH}$	Гексадекановая	Пальмитиновая	пальмитат
$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{16}-\text{COOH}$	Октадекановая	Стеариновая	стеарат

Алгоритм названия карбоновых кислот:


1. Находим главную цепь атомов углерода и нумеруем её, начиная с карбоксильной группы.
2. Указываем положение заместителей и их название (названия).
3. После корня, указывающего число атомов углерода в цепи, идет суффикс «-овая» кислота.
4. Если карбоксильных групп несколько, то перед «-овая» ставится числительное (-ди, - три...)

Пример:




3- метилбутан + **-овая** = **3-метилбутановая**
кислота **кислота**


ДАЙТЕ НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВАМ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ




(2 – МЕТИЛПРОПАНОВАЯ КИСЛОТА)



(2, 3 – ДИМЕТИЛПЕНТА-
НОВАЯ КИСЛОТА)



(2 – МЕТИЛПЕНТЕН – 3 – ОВАЯ
КИСЛОТА)






(2 – ЭТИЛБУТАНДИОВАЯ КИСЛОТА)

Алгоритм записи формул карбоновых кислот

1. Выделить корень слова на основании, которого записать углеродный скелет в состав, которого входит карбоксильная группа.
2. Нумеруем атомы углерода, начиная с карбоксильной группы.
3. Указываем заместители согласно нумерации.
4. Необходимо дописать недостающие атомы водорода (углерод четырёхвалентен).
5. Проверить правильность записи формулы.

Пример:

2-метилбутановая кислота.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

C₁ – C₃

Жидкости с характерным резким запахом, хорошо растворимые в воде



C₄ – C₉

Вязкие маслянистые жидкости с неприятным запахом, плохо растворимые в воде



C₁₀ и более

Твердые вещества, не имеющие запаха, не растворимые в воде



Физические свойства уксусной КИСЛОТЫ:

Агрегатное состояние **жидкое**

Цвет **бесцветная прозрачная
жидкость**

Запах **резкий уксусный**

Растворимость в воде **хорошая**

Температура кипения **118 ° С**

Температура плавления **17°С**





Зависимость физических свойств карбоновых кислот от строения молекулы:

Низшие карбоновые кислоты – жидкости; высшие – твердые вещества

Чем больше относительная молекулярная масса кислоты, тем меньше ее запах.

С увеличением относительной молекулярной массы кислоты растворимость уменьшается

• Гомологический ряд альдегидов начинается с двух газообразных веществ (при комнатной температуре), а среди карбоновых кислот газов нет. С чем это связано?



Муравьиная кислота (Метановая кислота)

- Химическая формула CH_2O_2 , или HCOOH .

- Муравьиная кислота открыта в кислых выделениях рыжих муравьев в 1670 г. английским естествоиспытателем Джоном Реем.



Муравьиная кислота присутствует также в тончайших волосках крапивы, в пчелином яде, сосновой хвое, в небольших количествах найдена в различных фруктах, тканях, органах, выделениях животных и человека.

Применение муравьиной кислоты

Муравьиная кислота обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Поэтому ее водные растворы используют как:

- Пищевой консервант;
- Парами дезинфицируют тару для продовольственных товаров (в том числе винные бочки);
- В пчеловодстве - эффективное средство от варроатоза – болезни пчел, вызываемой клещами-паразитами ;
- Консервант при заготовке силоса;
- В медицине слабый водно-спиртовой раствор муравьиной кислоты (муравьиный спирт) используется при ревматических и неврологических болях для растирания;
- В органическом синтезе в качестве восстановителя ;
- Протрава при крашении тканей;
- В кожевенном производстве – для отмывания извести, используемой при обработке шкур;
- При изготовлении тяжелых жидкостей – водных растворов, обладающих большой плотностью, в которых не тонут даже камни. Такие жидкости нужны геологам для разделения минералов по плотности. Насыщенный раствор формиата таллия HCOOTl в зависимости от температуры может иметь плотность от $3,40\text{г/см}^3$ (при 20°C) до $4,76\text{ г/см}^3$ (при 90°C)



Вопрос:

Почему нельзя смачивать водой место муравьиного укуса или ожога крапивой? Это приводит только к усилению болевых ощущений.

Почему боль утихает, если пораненное место смочить нашатырным спиртом?


Что ещё можно использовать в данном случае?

При растворении муравьиной кислоты в воде происходит процесс электролитической диссоциации:



В результате кислотность среды повышается, и процесс разъедания кожи усиливается.

Чтобы боль утихла, нужно нейтрализовать кислоту, для чего необходимо использовать растворы, обладающие щелочной реакцией, н-р, раствор нашатырного спирта.



Уксусная кислота (этановая кислота)

- Это – первая кислота, полученная и использованная человеком.
- «Родилась» более 4 тыс. лет назад в Древнем Египте.
- На рубеже XVII – XVIII вв. в России ее называли «кислая влажность».
- Впервые получили при скисании вина.
- Латинское название – *Acetum acidum*, отсюда название солей – ацетаты.
- Ледяная уксусная кислота при температуре ниже 16,8 °C твердеет и становится похожей на лед
- Уксусная эссенция - 70%-раствор кислоты.
- Столовый уксус - 6 % или 9%-й раствор кислоты.



Уксусная кислота

- содержится в выделениях животных (моче, желчи, испражнениях), в растениях (в частности, в зеленых листьях), в кислом молоке и сыре;
- образуется при брожении, гниении, скисании вина и пива, при окислении многих органических веществ;

Применение уксусной кислоты

- Водные растворы уксусной кислоты широко используются в пищевой промышленности (пищевая добавка **E- 260**) и бытовой кулинарии, а также в консервировании;
- при производстве:
- лекарств, н-р, аспирина;
- искусственных волокон, н-р, ацетатного шелка;
- красителей-индиго, негорючей киноплёнки, органического стекла;
- растворителей лаков;
- химических средств защиты растений ,
- стимуляторов роста растений;
- Ацетат натрия CH_3COONa применяется в качестве консерванта крови, предназначенной для переливания;
- Ацетат калия CH_3COOK – как мочегонное средство;
- Ацетат свинца $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ - для определения сахара в моче;
- Ацетаты железа (III) $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Fe}$, алюминия $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Al}$ и хрома (III) $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Cr}$ используют в текстильной промышленности для протравного крашения;
- Ацетат меди (II) $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu}$ входит в состав препарата для борьбы с вредителями растений, так называемой парижской зелени;

Применение уксусной кислоты

Известно применение спиртового уксуса в косметологии. А именно для придания мягкости и блеска волосам после химической завивки и перманентной окраски. Для этого волосы рекомендуется ополаскивать теплой водой с добавлением спиртового уксуса (на 1 литр воды - 3-4 ложки уксуса).

В народной медицине уксус используется как неспецифическое жаропонижающее средство. при головных болях методом примочек. при укусах насекомых посредством компрессов.

Знаете ли вы, что


-Если потребуется отвинтить ржавую гайку, то рекомендуется вечером положить на нее тряпку, смоченную в уксусной кислоте? Утром отвинтить эту гайку будет значительно легче.

- В течении суток в организме образуется 400г уксусной кислоты? Этого хватило бы для изготовления 8 л обычного уксуса



незаменима в производстве парфюмерных продуктов


Из всех кислот
Она, конечно, прима.
Присутствует везде
И зримо и незримо.
В животных и растениях есть она,
С ней техника и медицина навсегда.
Её потомство – ацетаты-
Очень нужные «ребята».
Всем известный аспирин,
Он, как добрый господин,
Жар больного понижает
И здоровье возвращает.
Это – меди ацетат.
Он растениям друг и брат,
Убивает их врагов.
От кислоты ещё есть толк –
Нас одевают в ацетатный шелк.
А пельмени любит кто,
Знает укус тот давно.
Есть ещё вопрос кино:
Хорошо всем надо знать,
Что без пленки ацетатной нам кино не увидеть.
Конечно, есть и другие применения.
И вам они известны без сомнения.
Но главное, что сказано, друзья,
«Хлеб промышленности» уксусная кислота.



Водный раствор
ацетата меди



**Карбо-
новые
кислоты
в
порядке
увеличе-
ния их
кислот-
ности**



Выводы

1. Карбоновые кислоты- это органические соединения, молекулы которых содержат карбоксильную группу – COOH, связанную с углеводородным радикалом.

2. Карбоновые кислоты классифицируются :

- по основности (одно-, двух- и многоосновные)
- по углеводородному радикалу (предельные, непредельные и ароматические)
- по содержанию атомов С (низшие и высшие)

3. **Название** карбоновой кислоты складывается из названия **алкана + овая кислота**.

4. С увеличением молекулярной массы карбоновой кислоты растворимость и сила кислоты уменьшается.

5. Как и неорганические кислоты , растворимые карбоновые кислоты **диссоциируют в водном растворе**, образуя ионы водорода и изменяют окраску индикатора. Реагируют с металлами (до H), основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями более слабых кислот, образуя соли.

6 Широко распространены в природе и имеют большое практическое значение для человека.