


Травмы и болезни кожи.

8 класс

Бородулина Ю.


В.






ОПРОС

Опиштите строение кожи



Производные кожи



Травмы

КОЖИ

потертости

опрелости

ОЖОГИ

обморожения

ПРИЧИНЫ

- механические
- химические
- микробиологические

Потертость

Поверхностное повреждение наружных покровов кожи, которое возникает в результате трения или давления одеждой, обувью, ремнями.




Опрелость

Воспалительное заболевание, поражение бактериями, грибками или вирусами складок кожи, которое развивается из-за раздражения кожной секрецией.





Ожог

Повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или некоторыми химическими веществами.



Площадь ожога

При поражении **10%** поверхности тела, наступает ожоговый шок.



I степени — покраснение кожи;

II степени — образование пузырей;

III степени — омертвение кожи;

IV степени — обугливание тканей.

Ожоги по глубине



Первая помощь при ожогах (I и II степень)


Охладите пораженные участки кожи.



Обработайте обожженную кожу специальными аэрозолями.



Наложите стерильную повязку.



Вызовите скорую медицинскую помощь!



Первая помощь при ожогах (III и IV степень)

Охладите пораженные участки кожи.




Пораженные участки тела обливайте холодной водой.



При обширных поражениях укройте пострадавшего.
Дайте воды и 1-2 таблетки анальгина.



Вызовите скорую медицинскую помощь!



Обморожение

Представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур.

I степень




II степень



III степень



IV степень



кожа белеет, затем краснеет и припухает, появляются покалывание и боль;

образуются волдыри с кровяным содержимым, возникает сильная боль;

происходит омертвление кожи и подкожных тканей;

развивается омертвление глубоко расположенных тканей и костей.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ I СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИ ОБЩЕМ ОХЛАЖДЕНИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ*



Внести в теплое, сухое помещение.



Снять обувь и одежду.



Тепло укутать, напоить горячим чаем или кофе, молоком.



Начать немедленно согревать обмороженные части тела

растиранием чистыми руками, смоченными спиртом,

до появления чувствительности;

с помощью теплой ванны в течение 20-30 минут, постепенно повышая температуру воды с 20°C до 40°C, промыв поврежденное место мылом.



Отогретый поврежденный участок высушить, закрыть стерильной повязкой и тепло укутать.




НЕ смазывать обмороженные участки жиром и мазями.



НЕ растирать кожу при появлении отека и волдырей.



НЕ растирать снегом.



При обморожении **II-IV степени** быстрое согревание, массаж или растирание НЕ делают.

На пораженную поверхность накладывают теплоизолирующую повязку** и как можно скорее доставляют пострадавшего в больницу.



* Состояние, возникающее при понижении температуры тела ниже 34°C.

** Слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, сверху клеенка или прорезиненная ткань.




КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ


Угревая сыпь



Вирус папилломы - бородавки





Med-ik.ru



Грибок – стригущий пишай



Чесоточный зудень - чесотка



Стрептококк – рожистое воспаление (стрептодермия)

