



ГРИБ

Ы

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

Белый гриб (Боровик)

- Шляпка Белого гриба бурая с красноватым или каштановым оттенком, часто неравномерно окрашена. Ножку имеют твёрдую и посередине широкую. Они больше других грибов.



Подосиновик

- Шляпка мясистая, желтовато-красного, буро-красного, оранжево-красного цвета. Ножка прямая, высокая, у основания утолщенная, белая с темно-коричневыми чешуйками.



Лисичка

- Шляпка часто с волнистым краем или неправильной формы. Ножка сросшаяся со шляпкой и одного с ней цвета или более светлая. Цвет от светло-желтого до оранжево-желтого.



Опята

- Шляпка в молодости полушаровидной формы, которая позже становится зонтиковидной. Может быть окрашена в различные оттенки от медово-коричневого до зеленовато-оливкового, в центре более тёмная. Ножки длинные со светлой жёлто-коричневой поверхностью, в нижней части темнее. Растут «семейками».



Сыроежка

- Шляпка сначала шаровидная позднее расплостёртая, плоская или воронковидная, реже выпуклая. Кожица разнообразной окраски, сухая, реже влажная, иногда растрескивающаяся. Ножка цилиндрическая, ровная, реже утолщённая или заострённая у



Масленок

- Шляпка от выпуклой до плоской формы, гладкая, желто-коричневого цвета. Кожица разнообразной окраски, сухая, реже влажная, иногда растрескивающаяся. Ножка сплошная, гладкая, иногда с кольцом.



ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

Бледная поканка

- Шляпка оливковая, зеленоватая или сероватая от полушаровидной до плоской формы с гладким краем. Ножка целлиндрическая с утолщением у основания. Цвет как у шляпки или беловатый. Под шляпкой часто бывает характерная юбочка.



Мухомор

- Шляпка сначала шаровидная, позднее выпукло-распростертая, с тонким рубчатым краем ярко или оранжево-красная с многочисленными белыми бородавками. Ножка длинная, утолщенная у основания, белая или желтоватая с

