

К ЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА

В структуре госпитализации − 1-6%
всех госпитализированных по поводу СД.

 В общей структуре причин смерти больных СД - 2-4%.

ПРИЧИНЫ КЕТОАЦИДОЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

- Несвоевременное обращение к врачу.
- Ошибки инсулинотерапии (неправильный подбор дозы инсулина, неоправданное уменьшение дозы, замена препаратов).
- Неправильное поведение больного (нарушение диеты, употребление алкоголя, самостоятельное изменение дозы вводимого инсулина).
- Острые интеркуррентные заболевания (инфекционные, гнойные и т.д.).
- Острые сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт и т. д.).
- Физические и психические травмы, хирургические вмешательства.
- Беременность.

ПАТОГЕНЕЗ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ

Абсолютный дефицит инсулина

инсулиновая **недостаточность**

снижение способности тканей утилизировать глюкозу

гипергликемия

активация контринсулярных гормонов

активация глюконеогенеза и кетогенеза

повышение уровня кетоновых тел

гиперосмолярность—осмотический диурез

гиповолемия, гипоксия

дегидратация

потеря электро-

гипокалиемия

метаболический ацидоз

Ведущие синдромы при кетоацидозе:

- Инсипидарный синдром (жажда,полиурия, сухость во рту);
- Синдром дегидратации;
- Синдром кетоацидоза;
- Абдоминальный синдром;
- Синдром угнетения ЦНС;
- Синдром поражения сердечно-сосудистой системы;
- Синдром проявления фонового заболевания.

Клинические стадии диабетического кетоацидоза:

- Умеренный кетоацидоз;
- Прекома (декомпенсированный кетоацидоз);
- Кетоацидотическая кома.

Клинические проявления умеренного кетоацидоза

- Нарастающая полидипсия, полиурия;
- Выраженная слабость;
- Шум в ушах, оглушенность;
- Нарастающая сонливость, вялость
 - апатия;
- Тошнота, рвота;
- Запах ацетона.

Стадия прекомы

- Ухудшение общего состояния;
- Рвота до неукротимой;
- Боли в животе, явления перитонизма;
- Парез кишечника, динамическая непроходимость;
- Ступор, смена на прогрессирующий сопор;
- Ослабление рефлексов;
- Дыхание Куссмауля;
- Рубеоз, дегидратация.



Стадия кетоацидотической комы:

- Состояние крайне тяжелое;
- Сухожильные рефлексы полностью отсутствуют;
- Некоторое время сохраняются зрачковый и глотательный рефлекс;
- Снижен тургор кожи, тонус глазных яблок;
- Дыхание Куссмауля, запах ацетона;
- Цианоз кожных покровов;
- Живот вздут, передняя брюшная стенка напряжена, печень увеличена;
- Артериальное давление низкое, развитие олигурии, анурии.

Основные клинические формы кетоацидоза:

- Абдоминальная (желудочно-кишечная);
- Кардиоваскулярная (коллаптоидная);
- Нефротическая;
- Энцефалопатическая (псевдомозговая).

Неотложная помощь при кетоацидозе:

- Инсулинотерапия (режим малых доз);
- Регидратация;
- Восстановление электролитного баланса;
- Коррекция метаболического ацидоза.

ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ КОМА


_ Летальность > 40%





- Длительный прием мочегонных препаратов, иммунодепрессантов, глюкокортикоидов;
- Острые желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся рвотой и диареей (гастрит, энтерит, панкреатит, пищевое отравление);
- Обширные ожоги;
- Массивные кровотечения;
- Гемодиализ или перитонеальный диализ;
- Избыточное употребление углеводов;
- Введение гипертонических растворов глюкозы;
- Другие состояния, сопровождающиеся значительной потерей жидкости.

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМЫ



Клинические проявления гиперосмолярной комы

- Полидипсия, полиурия, сухость кожи;
- Повышение температуры;
- Тахикардия, экстрасистолия, артериальная гипотония;
- Поверхностное учащенное дыхание с затрудненным вдохом;
- Неврологические расстройства:
 - сопор, галлюцинации;
 - менингиальные признаки;
 - гемипарезы, параличи;
 - эпилептиформные припадки;
 - тромбозы

- КРИТЕРИИ ЛАБОРАТОРНОЙ
- ДИАГНОСТИКИ:
- гликемия > 50-80 ммоль/л;
- осмолярность 400-500 мОсм/л;
- гипернатриемия > 150 ммоль/л;
- гипокалиемия;
- увеличение содержания мочевины;
- признаки сгущения крови;
- глюкозурия

ЛЕЧЕНИЕГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМЫ:


- Регидратация (при осмолярности > 320 мОсм/л 0,45% раствор хлорида натрия);
- Инсулинотерапия (режим малых доз);
- Устранение явлений гиперкоагуляции (аспирин, гепарин, клексан и др.);
- Предупреждение отека мозга

ЛАКТАЦИДОЗ ГИПЕРЛАКТАЦИДЕМИЧЕСКАЯ КОМА

Причины:

- Инфекционные и воспалительные заболевания;
- Массивные кровотечения;
- Острый инфаркт миокарда;
- Хронический алкоголизм;
- Тяжелые физические травмы;
- Хронические заболевания печени;
- Почечная недостаточность;
- Употребление бигуанидов.

ПАТОГЕНЕЗ ЛАКТАЦИДОЗА



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛАКТАТАЦИДОЗА:

- острое начало с выраженными диспептическими расстройствами (имитация острой хирургической патологии);
- Боли в мышцах, стенокардия;
- Стенокардия;
- Одышка, коллапс, дыхание Куссмауля;
- Гипотония и быстрая потеря сознания.

Лабораторные критерии лактацидоза:

- увеличение содержания молочной кислоты (>1,5 ммоль/л);
- уменьшение бикарбонатов крови (ниже 2 ммоль/л);
- снижение резервной щелочности крови (< 50%);
- нормогликемия или небольшая гипергликемия (12-16 ммоль/л);
- глюкозурия;
- отсутствие ацетона в моче.

АНИОНОВЫЙ ИНТЕРВАЛ (АИ)

$$AU = Na - [(C1) + (HCO3)]$$

Норма: 8-16 мэкв/л

ЛЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИДОЗА

- Устранение ацидоза
- Борьба с гипоксией
- Инсулинотерапия
- Противошоковые
- Нормализация КЩР



Гипогликемия

Биохимические критерии: сахар крови ниже 2,8 ммоль/л

5-10% пациентов в течение года испытывают хотя бы одну тяжелую гипогликемию.

3-4% больных СД погибают от тяжелой гипогликемии

Причины гипогликемии у больных СД:

- Ошибки при проведении инсулинотерапии;
- Передозировка препаратов сульфанилмочевины или меглитинидов;
- Пропуск очередного приема пищи;
- Тяжелая физическая нагрузка;
- Прием алкоголя;
- Недостаточная информированность пациента;
- Бессимптомные гипогликемии как проявление автономной нейропатии.

Патогенез гипогликемической комы:



Клиническая картина гипогликемии

- Чувство голода;
- Озноб, потливость;
- Сердцебиение;
- Бледность или покраснение лица;
- Психомоторное возбуждение, агрессия;
- Повышение АД;
- На фоне спутанного сознания гипертонус скелетной мускулатуры, тонические и клонические судороги;
- Патологические рефлексы (с-м Бабинского и др.);
- Зрачки расширены;
- Дыхание обычной глубины и частоты;
- Температура тела с тенденцией к снижению.

Ведущие синдромы гипогликемического состояния:

- Синдром реактивной активации автономной нервной системы:
 - * гиперсимпатикотония (психомоторное возбуждение, агрессивность, сердцебиения, тахикардия, тремор, повышение АД, бледность кожных покровов, мидриаз);
 - * холинергическая гиперактивность (ощущение сильного голода, тошнота, слюнотечение, профузная потливость);
- Синдром нейрогликопении (головная боль, головокружение, слабость, нарушение координации, дезориентация, неадекватное поведение, транзиторные нарушение зрения и речи, парестезии, спутанность сознания и кома)

Лечение гипогликемии (определяется тяжестью)

- Глюкоза;
- Контринсулярные гормоны;
- Симптоматическая терапия.

