Первообразная и интеграл

Содержание

- Первообразная
- Интеграл

а) неопределённый

б) определённый



Первообразная

Определение

Функция F(x) называется первообразной функции f(x) на промежутке X, если

$$\forall x \in X \quad F'(x) = f(x)$$

На практике промежуток X обычно не указывают, но подразумевают (область определения функции).

Например: ***функция $y = x^2$ является первообразной для функции $y=2x$, т.к. для любого x справедливо***

$$(x^2)' = 2x.$$

Теорема 1

Если функция f(x) непрерывна при $x \in X$ ***, то для f(x) существует первообразная F(x) на X.***

Теорема 2

Если F(x) одна из первообразных функции f(x), на промежутке X, то у функции y = f(x) бесконечно много первообразных, и все они имеют вид y = F(x)+C.

Таблица первообразных

Зная формулы для нахождения производных, можно составить таблицу для нахождения первообразных

f(x)	F(x)
0	C
1	x
x	$x^2/2$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
1/x	ln|x|
sinx	-cosx
cosx	sinx
e^x	e^x
a^x	a^x/lna

Правила нахождения первообразных

1. Первообразная суммы равна сумме первообразных
2. Если $F(x)$ – первообразная для $f(x)$, то $к \cdot F(x)$ – есть первообразная для $к \cdot f(x)$.
3. Если $F(x)$ – первообразная для $f(x)$, то первообразной для функции $y= f(кx+m)$ служит функция $y = 1/к \cdot F(кx+ m)$

Найдём одну из первообразных

Если f(x) равно:

1) $f(x)=2x+x^3$
2) $f(x)=4x-2$
3) $f(x)=x^3-3x^2+x-1$
4) $f(x)=4x^5+2x+e$
5) $f(x)=x^4+3x^2+5$
6) $f(x)=5\cos x-3\sin 2x$

Значит F(x) равно:

- $F(x)= x^2+x^4/4$
- $F(x)=2x^2-2x$
- $F(x)=x^4/4-2x^3+x^2/2-x$
- $F(x)=2x^6/3+x^2+ex$
- $F(x)=x^5/5+x^3+5x$
- $F(x)=5\sin x+3/2\cos x$

Ответить на вопрос:

какая функция является перообразной для функции

$$f(x)= 2\sin x - \cos x?$$

А) cosx - 2sinx

Б) 2cosx - sinx

В) -2cosx - sinx

Г) –cosx + 2sinx

Ответ: в

Выберите ответ, при котором предложение будет верно.

Функция F(x) является первообразной для функции f(x), если:

А) $F'(x) = f(x)$

Б) $F'(x) = - f(x)$

В) $f'(x) = F(x)$

Г) $f(x) = F(x)$

Ответ: А

Ответить на вопрос:

для какой функции первообразной является функция $F(x)=2x^3+6x^2+x-9$?

А) $f(x) = 1/4\cdot x^4+2x^3+x^2-9x$

Б) $f(x) = 2x^4+6x^3+x^2-9x$

В) $f(x) = 6x^2+12x+1$

Г) $f(x) = x^4/2+2x^3+1/2\cdot x^2-9x$

Ответ: Г

Ответить на вопрос:

производная какой из функций равна $y = 4x - 3x^2$?

А) $F(x) = 2x^3-2x^2+C$

Б) $F(x) = 2x^2-1/3\cdot x+C$

В) $F(x) = 2x^2-x^3+C$

Г) $F(x) = 4x^2-x^4+C$

Ответ: В

Задание №1. Найдите первообразную функции f(x), график которой проходит через точку А.

а) $f(x)=5x+x^2$, $A(0;3)$ б) $f(x)=3x - 5$, $A(4;10)$

Решение. а) **Найдём первообразные**

$F(x)= 5x^2/2+x^3/3+ C$, **где** C **– произв. число.**

Найдём это C**:**

т.к. график проходит через точку $A(0;3)$**, то**

$F(0)= 5\cdot0^2/2+0^3/3+ C = C$ **и равно 3.**

$C=3$

Значит производная, график которой проходит через т. А, имеет вид:

$$F(x)= 5x^2/2+x^3/3+3.$$

б) $f(x)=3x - 5$, $A(4;10)$

Решение. $F(x)=3x^2/2-5x+C$, *где* C – *произв. число.*

$F(4)=3\cdot4^2/2-5\cdot4+C=24-20+C=4+C$ и

$4+C=10 \Rightarrow C=6$, тогда

$F(x)= 3x^2/2-5x+6$

Ответ: $F(x)=3x^2/2-5x+6$

Самостоятельно

Найдите первообразную функции f(x), график которой проходит через точку А, если:

1) $f(x)=x^2-5$, A(3;4)
2) $f(x)=2x^2+3$, A(-2;-5)
3) $f(x)=(x-2)^2$, A(0;2)
4) $f(x)=\cos 3x$, A(0;1)

Проверим ответы

1) $F(x)= x^3/3 - 5x + 10$

2) $F(x)= 2x^3/3 + 3x + 6(1/3)$

3) $F(x)= x^3/3 - 2x^2 + 4x + 2$

4) $F(x)= 1/3 \cdot \sin 3x + 1$

Задание №2. **Найдите первообразную функции f(x), значение которой при $x = x_0$ равно y_0.**

а) $f(x)=10x^4+x$; $x_0=0$; $y_0=6$

<u>**Решение.**</u> $F(x)= 10x^5/5 + x^2/2 + C$

$= 2x^5+ x^2/2 +C$, где C – произв. число.

Найдём С. Т.к. по условию

$F(x_0)=y_0$,

то $F(0)=2\cdot0^5+0^2/2+C=C$ и равно

$y_0= 6$.

Значит ответ: $F(x)=2x^5+x^2/2+6$

б) $f(x)=2\sin 3x+4\cos(x/2)$; $x_0=\pi/3$; $y_0=0$

Решение.

$F(x)=-2\cdot 1/3\cdot\cos 3x+4\cdot 2\sin(x/2)+C=$

$=-2/3\cdot\cos 3x+8\cdot\sin(x/2)+C$, где C- пр. ч.

Найдём C. Т.к. по условию $F(x_0)=y_0$, то $F(\pi/3)=-2/3\cdot\cos\pi+8\sin(\pi/6)+C=$

$=2/3+8\cdot 1/2+C=4(2/3)+C$ и равно 0.

Тогда $C = -4(2/3)$.

Значит $F(x)=-2/3\cdot\cos 3x+8\cdot\sin(x/2)-4(2/3)$

в) $f(x)=4+6x^2$; $x_0=2$; $y_0<0$

<u>Решение.</u> $F(x)= 4x+6x^3/3+C$, где C-п.ч.

Найдём C: т.к. $F(x_0)= y_0$, то

$F(2)= 4\cdot2+6\cdot2^3/3+C= 8+16+C=24+C$

и $24+C<0$ => $C<-24$.

Пусть это будет (-25).

Тогда ответ $F(x)= 4x+6x^3/3-25$

г) $f(x)=2x^3+x^2+3$; $x_0=1$; $y_0>0$

<u>Решение.</u> $F(x)= 2x^4/4+x^3/3+3x+C$,

где C- пр.ч.

Найдём C.

$F(1)= 2\cdot1^4/4+1^3/3+3\cdot1+C = 3(5/6)+C$,

но $3(5/6)+C>0$ => $C > - 3(5/6)$

Пусть C=-1, тогда

$$F(x)= 2x^4/4+x^3/3+3x-1$$

Задание №3. Найдите множество первообразных функции f(x).

а) $f(x) = \sin^2 x$ б) $f(x) = \sin 5x \cdot \cos 6x$

Решение.

а) т.к. $f(x) = \sin^2 x$

$= (1 - \cos 2x)/2 = ½ - 1/2 \cdot \cos 2x$,

то одна из первообразных равна:

$F(x) = 1/2 \cdot x - 1/4 \cdot \sin 2x$.

Тогда множество всех перообразных равно

$F(x) = 1/2 \cdot x - 1/4 \cdot \sin 2x + C$, где C –пр. число

б) $f(x) = \sin 5x \cdot \cos 6x$

<u>Решение.</u> т.к. $f(x) = \sin 5x \cdot \cos 6x =$
$= 1/2 \cdot (\sin 11x - \sin x)$,
то множество всех первообразных данной функции будет равно

$F(x) = 1/2 \cdot (-1/11 \cdot \cos 11x + \cos x) + C =$

$= 1/2 \cdot \cos x - 1/22 \cdot \cos 11x + C$

ИНТЕГРАЛЫ



ИНТЕГРАЛ

Неопределенный интеграл

Определённый интеграл

Обозначение:

$$\int f(x)dx \qquad \int_a^b f(x)dx$$

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

$$\int f(x)dx$$

Определение:

Множество всех первообразных функции f(x) на некотором промежутке называется неопределенным интегралом от функции f(x) на этом промежутке и обозначается

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Основные свойства неопределенного интеграла.

$$1.\ \left(\int f(x)dx\right)' = f(x).$$

$$2.\ \int f'(x)dx = f(x) + C.$$

$$3.\ \int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx.$$

т.е. постоянный множитель можно выносить за знак интеграла

Основные свойства неопределенного интеграла.

$$4.\ \int \left(f_1(x)+f_2(x)\right)dx=\int f_1(x)\,dx+\int f_2(x)\,dx.$$

$$5.\ \int f(kx+b)\,dx=\frac{1}{k}F(kx+b)+C.$$

$$6.\ \int f(x)\,d(g(x))=f(x)g(x)-\int g(x)\,d(f(x)).$$

Таблица основных неопределённых интегралов

$$\int k dx = k \cdot x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, где\, n \in N$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctgx + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = tgx + C$$

Таблица интегралов

1. $\int k\,dx = k \cdot x + C$
2. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1)$
3. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
4. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$
5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
6. $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} \cdot e^{kx} + C$
7. $\int \sin kx\,dx = -\frac{1}{k} \cdot \cos kx + C$
8. $\int \cos kx\,dx = \frac{1}{k} \cdot \sin kx + C$
9. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$
10. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C$
11. $\int \operatorname{tg} kx\,dx = -\frac{1}{k} \cdot \ln|\cos kx| + C$
12. $\int \operatorname{ctg} kx\,dx = \frac{1}{k} \cdot \ln|\sin kx| + C$

Определение

- **Процесс нахождения интеграла называется интегрированием**
- **Интегрирование является операцией, обратной дифференцированию**

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

$$\int_a^b f(x)dx$$

Определение

Пусть функция *y=f(x)* определена и интегрируема на отрезке [*a,b*] и пусть *F(x)* – некоторая ее первообразная. Тогда число *F(b)–F(a)* называется интегралом от *a* до *b* функции *f(x)* и обозначается

$$\int_a^в f(x)dx = F(x)\Big|_a^b$$

Определение

Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная

графиком функции f(x),

графиками x=a и x=в, и осью OX



Формула Ньютона-Лейбница

Теорема: если функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a;в], то справедлива формула

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Опираясь на эту формулу получаются следующие свойства определенного интеграла

Свойства определенного интеграла

1. $\int_a^a f(x)dx = 0$;

2. $\int_a^b dx = b - a$;

3. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$;

4. $\int_a^b [f_1(x) + f_2(x)]dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx$;

Свойства определенного интеграла

5. $\int_a^b Kf(x)dx = K\int_a^b f(x)dx$;

6. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$;

7. $\int_a^b f(x)dx \geq 0$, если $f(x) \geq 0$.

Алгоритм вычисления площади криволинейной трапеции

1. **Схематично изобразить график функции *f(x)*.**
2. **Провести прямые *x=a* и *x=b*.**
3. **Записать одну из первообразных *F(x)* функции *f(x)*.**
4. **Составить и вычислить разность**
5. ***F(b) – F(a)*.**



F(x)=… …

S = F(b) – F(a)=…- …

Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями, используя формулу Ньютона-Лейбница

Вариант 1

$f(x) = 2x - 3$

$y = 0,$

$x = 3,$

$x = 5$

Вариант 2

$f(x) = -2x - 3$

$y = 0,$

$x = -5,$

$x = -3$

Рассмотрим графики функций





Проверим решение

Вариант 1. **Если f(x) = 2x – 3**

$$F(x) = x^2 - 3x$$

$$S = F(5) - F(3) =$$

$$= 5^2 - 3 \cdot 5 - \left(3^2 - 3 \cdot 3\right) =$$

$$= 10 - 0 = 10$$

Проверим решение

Вариант 2. **Если f(x) = – 2x – 3**

$$F(x) = -x^2 - 3x$$

$$S = F(-3) - F(-5) =$$

$$= -(-3)^2 - 3 \cdot (-3) -$$

$$-\left(-(-5)^2 - 3 \cdot (-5)\right) =$$

$$= 0 + 10 = 10$$

Вычисление площади плоских фигур с помощью определенного интеграла

Площадь фигуры (S), ограниченной прямыми x = a и x = в и графиками функций y = f(x) и y = g(x), непрерывных на отрезке [a; в] и таких, что для любого xє [a;в] выполняется неравенство g(x)≤ f(x), вычисляется по формуле:

$$S = \int_a^b \left(f(x) - g(x)\right)dx$$

Например:

Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций

$$y = -x^2 - 2x + 3$$

$$y = x^2 - 1$$

Построим графики функций



Значит

Пределы интегрирования:

от **-2** до **1**

f(x)= - x²-2x+3 **g(x)=x²** **- 1**

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

Тогда

$$S = \int_{-2}^{1} \left[\left(-x^2 - 2x + 3\right) - \left(x^2 - 1\right)\right]dx =$$

$$= \int_{-2}^{1} \left(-2x^2 - 2x + 4\right)dx =$$

$$= -2\int_{-2}^{1}\left(x^2 + x - 2\right)dx =$$

$$= -2\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x\right)\Bigg|_{-2}^{1} =$$

$$= -2\left[\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2\right) - \left(-\frac{8}{3} + \frac{4}{2} + 4\right)\right] = -2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 + \frac{8}{3} - 6\right) =$$

$$= -2\left(3 - 8 + \frac{1}{2}\right) = -2\left(-\frac{9}{2}\right) = 9$$

Запомним

- **Геометрический смысл** определенного интеграла – это ***площадь криволинейной трапеции***
- **Физический смысл** определенного интеграла – это…

(учебник: стр. 291)

Вычисление объема тела вращения

Объем тела, образованного вращением вокруг оси *Ox* криволинейной трапеции, ограниченной кривой y =f(x) отрезком оси абсцисс a ≤ x ≤ b и прямыми x=a; x=b, вычисляется по формуле

$$V_x = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Например

Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси *Ox* криволинейных трапеций, ограниченных линиями

$$y = x^2 \quad \text{и} \quad y = \sqrt{x}$$

Построим графики функций



Решение

Искомый объем можно найти как разность объемов, полученных вращением вокруг оси *Ox* криволинейных трапеций, ограниченных линиями $y=\sqrt{x}$ и $y = x^2$. Т.е.:

$$V_x = \pi\int_0^1 \left(\sqrt{x}\right)^2 dx - \pi\int_0^1 \left(x^2\right)^2 dx =$$

$$= \pi \int_0^1 x dx - \pi \int_0^1 x^4 dx =$$

$$= \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Bigg|_0^1 - \pi \cdot \frac{x^5}{5} \Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{10}$$

Применение интеграла

- **Площадь фигуры**
- **Объем тела вращения**
- **Работа электрического заряда**
- **Работа переменной силы**
- **Масса**
- **Перемещение**
- **Дифференциальное уравнение**
- **Давление**
- **Количество теплоты**

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями

1) $y=-3x^2-2$, $x=1$, $x=2$, $y=-1$

2) $y=4x-x^2$, $y=0$

3) $y=x^2-2x+3$, $x+y=5$

4) $y=x^2$, $y=|x|$