

Прогнозируемая ТИ

ИЛИ

Плановая ситуация

Подготовка персонала и оборудования

Выбор среди различных техник, например, ФОИ в сознании



Неожиданная ТИ

Адаптированные алгоритмы

Доступность необходимого оборудования

Рутинная преоксигенация

Релаксация при адекватной масочной вентиляции

Анестезиолог должен всегда иметь заранее сформулированный алгоритм действий в случае возникновения проблем при обеспечении проходимости ВДП!

- 1. Оценку вероятности развития и разработку плана действий при возникновении основных тактических проблем:
- Трудности взаимодействия с пациентом.
- Трудная вентиляция.
- Трудная установка НГВ
- Трудная ларингоскопия
- Трудная интубация.
- Трудный хирургический доступ



| 2. | Рассмотрение относительных клинических преимуществ | ВИ |
|----|--|-----|
| | выполнимость основных вариантов ведения ТДП в каж | дом |
| | конкретном случае: | |

| | Интубация в сознании / интубация после индукции общей анестезии |
|---|---|
| П | Неинвазивные / инвазивные техники для обеспечения проходимости |

- Неинвазивные / инвазивные техники для обеспечения проходимости ВДП
- ☐ Видеоассистированная ларингоскопия в качестве первоначального подхода к интубации (2013)
- □ Сохранение спонтанной вентиляции / применение миорелаксантов



| 3. Определение | начальной | или пр | едпочти | гельной | тактики | В |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---|
| случае: | | | | | | |

- □ Интубации в сознании.
- □ Пациента, которого можно адекватно вентилировать после индукции анестезии, но имеются трудности при интубации.
- □ Опасной для жизни ситуации, в которой пациента невозможно интубировать и невозможно оксигенировать (CICO can't intubate can't oxygenate)

- 4. Определение резервных действий, которые могут быть применены, если первичная тактика терпит неудачу или невыполнима.
- Например, пациенты, не способные к сотрудничеству, дети могут ограничить возможности по манипуляциям на ВДП, особенно это касается интубации в сознании. У таких пациентов для обеспечения проходимости ВДП могут потребоваться подходы, которые изначально являются резервными (трахеостомия под местной инфильтрационной анестезией или в условиях блокады нервов может быть альтернативным подходом, но он не может считаться категоричным и не дает основания отказываться от формулирования стратегии действий в случае трудной интубации.
- 5. Использовать ETCO2 для подтверждения правильного положения интубационной трубки.

Рекомендуемые техники ведения трудного дыхательного пути

При трудной вентиляции:

- Вентиляция маской при помощи ассистента
- Инвазивный доступ к дыхательным путям
- Надгортанный воздуховод (в т.ч. ларингеальная маска с каналом для зондирования желудка)
- Оро- или назофарингеальный воздуховод
- Ригидный вентиляционный бронхоскоп
- Транстрахеальная струйная вентиляция



Рекомендуемые техники ведения трудного дыхательного пути

При трудной интубации:

- Видеоларингоскоп
- Интубация в сознании
- Интубация вслепую (через рот или нос)
- Интубационный стилет или проводник
- Интубационный оптический стилет с вентиляцией
- Клинки различной конфигурации и размера
- Надгортанный воздуховод с возможностью последующей интубации
- Фиброоптическая интубация
- Хирургический доступ к ВДП








DIFFICULT AIRWAY ALGORITHM

- Assess the likelihood and clinical impact of basic management problems:
 - . Difficulty with patient cooperation or consent
 - · Difficult mask ventilation
 - Difficult supraglottic airway placement
 - Difficult laryngoscopy
 - · Difficult intubation
 - Difficult surgical airway access
- Actively pursue opportunities to deliver supplemental oxygen throughout the process of difficult airway management.
- 3. Consider the relative merits and feasibility of basic management choices:
 - Awake intubation vs. intubation after induction of general anesthesia
 - . Non-invasive technique vs. invasive techniques for the initial approach to intubation
 - · Video-assisted laryngoscopy as an initial approach to intubation
 - · Preservation vs. ablation of spontaneous ventilation

4. Develop primary and alternative strategies:







- *Confirm ventilation, tracheal intubation, or SGA placement with exhaled CO.
- a. Other options include (but are not limited to): surgery utilizing face mask or supraglottic airway (SGA) anesthesia (e.g., LMA, ILMA, laryngeal tube), local anesthesia infiltration or regional nerve blockade. Pursuit of these options usually implies that mask ventilation will not be problem-
- tion conduit (with or without fiberoptic guidance), fiberoptic intubation, intubating stylet or tube changer, light wand, ar blind oral or nasal intubation.

c. Alternative difficult intubation approaches include (b

are not limited to): video-assisted laryngoscopy, alternati

laryngoscope blades, SGA (e.g., LMA or ILMA) as an intub

atic. Therefore, these options may be of limited value if this step in the algorithm has been reached via the Emergency d. Consider re-preparation of the patient for awake intub Pathway. tion or canceling surgery.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕПРЕДВИДЕННО СЛОЖНОЙ ИНТУБАЦИИ

(Difficult Airway Society 2015 Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults, British Journal of Anaesthesia, 2015, 1–22)

doi: 10.1093/bja/aev371 Special Issue

65.

5

10

15

20

25

30

35

70

SPECIAL ISSUE

Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults

80

75

C. Frerk^{1,*}, V. S. Mitchell², A. F. McNarry³, C. Mendonca⁴, R. Bhagrath⁵, A. Patel⁶, E. P. O'Sullivan⁷, N. M. Woodall⁸ and I. Ahmad⁹, Difficult Airway Society intubation guidelines working group

85

¹Department of Anaesthesia, Northampton General Hospital, Billing Road, Northampton NN1 5BD, UK,
²Department of Anaesthesia and Perioperative Medicine, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, 235 Euston Road, London NW1 2BU, UK,
³Department of Anaesthesia, NHS Lothian, Crewe Road South, Edinburgh EH4 2XU, UK,
⁴Department of Anaesthesia, University Hospitals Coventry & Warwickshire NHS Trust, Clifford Bridge Road, Coventry CV2 2DX, UK,
⁵Department of Anaesthesia, Barts Health, West Smithfield, London EC1A 7BE, UK,
⁶Department of Anaesthesia, The Royal National Throat Nose and Ear Hospital, 330 Grays Inn Road, London WC1X 8DA, UK,
⁷Department of Anaesthesia, St James's Hospital, PO Box 580, James's Street, Dublin 8, Ireland,
⁸Department of Anaesthesia, The Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust, Colney Lane, Norwich NR4 7UY, UK, and
⁹Department of Anaesthesia, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, Great Maze Pond, London SE1 9RT, UK

*Corresponding author. E-mail: chris.frerk@ngh.nhs.uk

Непредвиденно сложная интубация трахеи

- Определяется как невозможность визуализации опытным анестезиологом какого-либо участка голосовой щели, либо как невозможность интубации на фоне удовлетворительной визуализации
- Основа действий алгоритм DAS последовательный ряд планов, которые будут использоваться при неудачной интубации трахеи;
- Приоритеты оксигенация при ограничении числа вмешательств на дыхательных путях, для минимизации травм и осложнений
- Принцип, согласно которому анестезиолог должен иметь резервные планы, прежде чем выполнять основные методы, сохраняется.

Пациенты умирают не от неудавшейся интубации, а от отсутствия оксигенации !!!



Ограничения алгоритма DAS

- Алгоритм не включает рекомендации по ведению пациентов с ожидаемо трудными дыхательными путями, как и не рассматривает заблаговременное выявление подобных проблем.
- Алгоритм не распространяется на беременных и детей.



Рекомендации DAS

- Особое внимание уделяется вопросам оценки, подготовки, позиционирования, преоксигенации, поддержания оксигенации и минимизации травмирования ДП.
- Рекомендуется ограничить количество вмешательств на ДП, слепые методы интубации (буж, ИЛМ) были заменены видео- или фибро-оптической интубацией.
- Если интубация трахеи не удается, рекомендуются НГВ для обеспечения оксигенации. Устройства второго поколения имеют свои преимущества и рекомендуются.
- Если интубации трахеи и установка надгортанных устройства неудачны, пробуждение пациента «опция по умолчанию».
- Если на данном этапе оксигенация через лицевую маску невозможна при наличии мышечной релаксации немедленно выполнить cricothyroidotomy.
- Хирургическая cricothyroidotomy рекомендуется в качестве предпочтительного метода и должна быть осуществлена на практике всеми анестезиологами.



Запомните!

- В каждом случае тщательно планируйте интубацию.
- Поддержание оксигенации имеет приоритет перед прочими мероприятиями.
- Необходимо избегать травматизации ДП за счет минимизации числа попыток интубации.
- Как можно раньше позовите на помощь.

Интубация трахеи не является самоцелью.

Адекватная оксигенация — первостепенная цель, которая достижима и без интубации.

Вторая задача — это обеспечение адекватной вентиляции, то есть поддержание оксигенации и удаление СО2.

Третья задача — защита от аспирации.



- Алгоритм ASA тщательно проработан и предлагает большой выбор действий врачу, что вместе с тем усложняет его и ограничивает его применение. Многие анестезиологи не помнят и, возможно, не могут запомнить этот алгоритм.
- Алгоритм DAS предлагает только два варианта действий на любом этапе, что исключает возможность выбора и облегчает его использование.



- Алгоритм DAS разработан специально для непредвиденно сложной интубации трахеи и содержит *план А, план В, план С и план D.* Он может быть модифицирован в зависимости от клинической ситуации.
- Этот алгоритм был осознанно разработан с предоставлением ограниченного выбора действий на каждом уровне принятия решений с целью сделать его более запоминающимся и простым к применению в стрессовой ситуации.
- Алгоритм DAS подразумевает, что попытки ларингоскопии были предприняты в оптимальных условиях, включая положение больного, изменение положения гортани извне, подбор адекватного размера интубационной трубки и использование мягкого бужа (интродьюсер интубационной трубки Eschmann).



Первоначальный план должен быть осуществлен в оптимальных условиях, которые включают:

1.Оптимальное положение головы и шеи

Голова должна находиться в положении «принюхивания», чтобы отверстие наружного слухового прохода находилось на уровне яремной вырезки.

2.Достаточная миорелаксация

Использование либо недеполяризующих миорелаксантов, либо суксаметония, в зависимости от клинической ситуации.

3.Оптимизация путем наружных манипуляций с гортанью

Используйте прием BURP. Если эти действия не улучшают видимость гортани по меньшей мере до III—IV степени по градации Cormack и Lehane (то есть, когда видна какая-либо часть голосовых связок), необходимо использовать альтернативные методики интубации — видеоларингоскоп, ларингоскопы с прямыми или изогнутыми гибкими клинками (клинок МакКоя), др.


Интродьюсер (эластический буж Эшмана) является недорогим устройством и должен всегда быть наготове, он прост в использовании и повышает частоту удачной интубации.



Структура базового алгоритма




DAS Difficult intubation guidelines - overview





Management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults




This flowchart forms part of the DAS Guidelines for unanticipated difficult intubation in adults 2015 and should be used in conjunction with the text.

ПЛАН А: Вентиляция через лицевую маску и интубация трахеи

Суть плана – максимально повысить вероятность успешной первой попытки ларингоскопии, в случае неудачи – ограничить число и длительность попыток с целью профилактики травмы ВДП и развития ситуации «нет вентиляции-нет оксигенации»



Management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults



ПЛАН А: Вентиляция через лицевую маску и интубация трахеи

- -Оптимизация положения головы
- -Преоксигенация
- -Адекватная миорелаксация
- -Прямая / Видеоларингоскопия (мах 3+1)
- -Наружные манипуляции на гортани
- -Буж
- -Ослабление давления на перстневидный хрящ
- -Поддержание оксигенации и анестезии

Трудности — зовите на помощь

Успешно


Подтвердить ИТ капнографически

Сообщить о неудачной интубации

План А Ключевые положения:

- Приоритет - поддержание оксигенации!

- Приподнятый головной конец classic 'sniffing' position, 'ramped' position (пациенты со сниженным ФОЕ)



- Преоксигенация (EtO2 0,8-0,9) **ВСЕМ** пациентам
- Апнойная оксигенация рекомендуется больным с высоки риском



План А Ключевые положения:

- -Подчеркивается важность нервно-мышечного блока
- -Важная роль видеоларингоскопии. Все анестезиологи должны иметь достаточный опыт в использовании видеоларингоскопии
- -Ограничение попыток ларингоскопии (3+1).
- -При наличии трудностей, давление на перстневидный хрящ следует ослабить.





Management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults

Plan B: Maintaining oxygenation: SAD insertion 2nd generation device recommended Change device or size (maximum 3 attempts) Oxygenate and ventilate

Declare failed SAD ventilation

STOP AND THINK

Options (consider risks and benefits):

- 1. Wake the patient up
- 2. Intubate trachea via the SAD
- 3. Proceed without intubating the trachea
- 4. Tracheostomy or cricothyroidotomy

ПЛАН В: Поддержание оксигенации: надгортанные воздуховоды

- Рекомендованы НГВ 2-го поколения
- •Смена устройства или размера (мах 3 попытки)
- •Оксигенация и вентиляция



ОСТАНОВИСЬ И ПОДУМАЙ

Варианты (оценить риски и пользу)

- 1. Разбудить пациента
- 2. Интубировать через НГВ
- 3. Продолжить без ИТ
- 4. Трахеостомия или

крикотиреотомия

Сообщить о неудачной установке НГВ



ПЛАН В: держание оксигенации: установка НГВ

Решение о типе НГВ, который планируется применить, следует принимать перед анестезией (зависит от оснащения, опыта врача, особенностей пациента)

НГВ 2 поколения следует ВСЕГДА иметь в наличии.

Все анестезиологи ОБЯЗАНЫ уметь применять НГВ.

Если операция не срочная – безопаснее разбудить пациента.



План В Ключевые положения:

- Признание неудачной интубации
- Акцент оксигенация через НГВ
- Рекомендовано использовать ЛМ второго поколения.
- Рекомендовано максимум 3 попытки установки НГВ
- Если проводится быстрая последовательная индукция давление на перстневидный хрящ необходимо прекратить для облегчения установки НГВ.
- Слепые методы интубации через НГВ не рекомедуются.

План В Ключевые положения:

Успешное применение НГВ создает условия для «остановиться и подумать» – принять взвешенное решение на фоне стабилизации состояния пациента!!!

ОСТАНОВИСЬ И ПОДУМАЙ Варианты (оценить риски и пользу)

- 1. Разбудить пациента
- 2. Интубировать через НГВ
- 3. Продолжить без ИТ
- 4. Трахеостомия или крикотиреотомия



Management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults

Plan C: Facemask ventilation If facemask ventilation impossible, paralyse Final attempt at facemask ventilation Use 2 person technique and adjuncts Declare CICO Succeed Wake the patient up

ПЛАН С: финальная попытка вентиляции маской

- Если вентиляция невозможна релаксировать
- Последняя попытка масочной вентиляции
- Вентиляция с ассистентом «в четыре руки»
- Использование воздуховода



Разбудить пациента

Сообщить о ситуации «не могу интубировать»

План С

Ключевые положения:

- Анестезиолог должен признать неудачные попытки установки НГВ
- Попытка оксигенации при помощи масочной вентиляции.
- Если попытка неудачна убедиться в адекватной мышечной релаксации релаксировать
- Если масочная вентиляция возможна продолжать оксигенацию и разбудить пациента
- Признать CICO ("не могу интубировать, не могу оксигенировать») и перейти к Плану D
- Продолжать попытки оксигенации при помощи лицевой маски, НГВ и назальных канюль



Failed intubation, failed oxygenation in the paralysed, anaesthetised patient

CALL FOR HELP

Continue 100% O₂
Declare CICO

Plan D: Emergency front of neck access

Continue to give oxygen via upper airway Ensure neuromuscular blockade Position patient to extend neck

ПЛАН Д: Экстренный доступ к шее

Ситуация «не могу интубировать - не могу оксигенировать» возникает, когда попытки обеспечить проходимость ДП путем интубации трахеи, вентиляции лицевой маской, НГВ не удаются.



Failed intubation, failed oxygenation in the paralysed, anaesthetised patient

CALL FOR HELP



Plan D: Emergency front of neck access

Continue to give oxygen via upper airway Ensure neuromuscular blockade Position patient to extend neck

Scalpel cricothyroidotomy

Equipment: 1. Scalpel (number 10 blade)

2. Bougie

3. Tube (cuffed 6.0mm ID)

Laryngeal handshake to identify cricothyroid membrane

Palpable cricothyroid membrane

Transverse stab incision through cricothyroid membrane Turn blade through 90° (sharp edge caudally) Slide coude tip of bougie along blade into trachea Railroad lubricated 6.0mm cuffed tracheal tube into trachea Ventilate, inflate cuff and confirm position with capnography Secure tube

Impalpable cricothyroid membrane

Make an 8-10cm vertical skin incision, caudad to cephalad Use blunt dissection with fingers of both hands to separate tissues Identify and stabilise the larynx

Proceed with technique for palpable cricothyroid membrane as above

Post-operative care and follow up

- Postpone surgery unless immediately life threatening
- · Urgent surgical review of cricothyroidotomy site
- · Document and follow up as in main flow chart

ПЛАН Д: Экстренный доступ к шее

Продолжать оксигенацию Обеспечить релаксацию Положение с разогнутой шеей

Хирургическая коникотомия

- 1. Скальпель (№ 10)
- 2. Буж с изогнутым (угловым) концом
- 3. Трубка (с манжетой, ID 6,0)




Положение пациента

«Принюхивающееся» положение, используемое для обеспечения дыхательных путей не является оптимальным для крикотиреодтомии, в этой ситуации требуется разгибание шеи.

В экстренной ситуации это может быть достигнуто подкладыванием валика под плечи, или подтягиванием пациента так, чтобы голова свисала.

«laryngeal handshake"


выполняется не доминантной рукой, определяя подъязычную кость и щитовидную пластину, стабилизируя гортань между большим и средним пальцем, и, спускаясь вниз по шее, пальпировать перстнещитовидную мембрану указательным пальцем.



Перстнещитовидная мембрана пальпируется - «техника скальпеля»


- Стабилизировать гортань, указательным пальцем определить перстнещитовидную мембрану;
- Поперечный разрез кожи и мембраны в направлении «к себе»;
- Поворот скальпеля на 90° (лезвие направлено каудально)
- В отверстие вводят буж, по которому продвигают трубку № 6;
- Положение трубки подтверждают капнографически и аускультативно, начинают оксигенацию и вентиляцию пациента.

Хирургическая крикотиреотомия





Потянуть скальпель, приоткрыв трахею, завести буж в трахею



Завести ЭТТ по бужу в трахею

Если перстнещитовидная мембрана плохо пальпируется (техника скальпель -палец-буж):


- Если УЗ-оборудование может быть немедленно доступно и включено, оно может помочь определить среднюю линию и основные кровеносные сосуды
- Выполняют вертикальный разрез кожи длиной 8-10 см в проекции гортани;
- Выполняют тупую диссекцию тканей по направлению к гортани;
- Идентифицируют и стабилизируют гортань, указательный палец ставят на мембрану;

• Скальпелем, расположенным под прямым углом к оси трахеи, прокалывают

мембрану;

• В отверстие вводят буж, по которому

- продвигают трубку № 6;
- Положение трубки подтверждают капнографически и аускультативно, начинают оксигенацию и вентиляцию



• Коникотомия при помощи канюли только для квалифицированных операторов

План D Основные положения

- Анестезиолог должен чётко объявить о планируемой коникотомии.
- Предпочтительна стандартная техника с использованием скальпеля.
- Установка стандартной трубки с манжеткой через крикотиреоидную мембрану способствует обеспечению нормальной минутной вентиляции с помощью стандартного контура.
- Оксигенация под давлением через узкопросветные канюли связана с **серьёзными осложнениями**!
- Каждый анестезиолог должен владеть техникой хирургического доступа.
- Обучение должно проводиться регулярно для поддержания навыков.

- 1. Трудные дыхательные пути огромная проблема анестезиологии даже на современном этапе
- 2. Выживаемость пациента с ТДП напрямую зависит от подготовки врача и доступности необходимого оборудования
- 3. Необходимо внедрение авторитетных международных рекомендаций по ведению ТДП в повседневную практику
- 4. Необходим постоянный тренинг анестезиологами навыков менеджмента ДП: масочная вентиляция, установка LMA, интубация (обычная, фиборооптическая, через LMA и с использованием видеоларингоскопов), коникотомия
- 5. Необходим тщательный разбор всех случаев ТДП с абсолютной доступностью материалов расследования для специалистов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Scalpel cricothyroidotomy

Equipment: 1. Scalpel (number 10 blade)

2. Bougie

3. Tube (cuffed 6.0mm ID)

Laryngeal handshake to identify cricothyroid membrane

Palpable cricothyroid membrane

Transverse stab incision through cricothyroid membrane

Turn blade through 90° (sharp edge caudally)

Slide coude tip of bougie along blade into trachea

Railroad lubricated 6.0mm cuffed tracheal tube into trachea

Ventilate, inflate cuff and confirm position with capnography

Secure tube


Impalpable cricothyroid membrane

Make an 8-10cm vertical skin incision, caudad to cephalad

Use blunt dissection with fingers of both hands to separate tissues

Identify and stabilise the larynx

Proceed with technique for palpable cricothyroid membrane as above



Для тех, кто выжил :) Клинические случаи



