

Две дельта-функциональные ямы в импульсном представлении

Записать уравнение Шрёдингера в импульсном представлении

Правило перехода в импульсное представление

$$U(p, p') = \iint dx dx' \psi_p^*(x) \cdot U(x, x') \psi_{p'}(x')$$

Найти ядро оператора потенциальной энергии в координатном представлении?

Ядро оператора потенциальной энергии в координатном представлении

$$U(x, x') = U(x)\delta(x - x')$$

Записать уравнение Шрёдингера в импульсном представлении

Ядро потенциальной энергии в импульсном представлении

$$U(p, p') = -\frac{\alpha}{2\pi\hbar} \iint dx dx' e^{-ipx/\hbar} \cdot [\delta(x+a) + \delta(x-a)] \delta(x-x') \cdot e^{ip'x'/\hbar}$$

$$U(p, p') = -\frac{\alpha}{2\pi\hbar} \iint dx e^{-i(p-p')x/\hbar} \cdot [\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

$$U(p, p') = -\frac{\alpha}{2\pi\hbar} \cdot \left[e^{i(p-p')a/\hbar} + e^{-i(p-p')a/\hbar} \right]$$

Волновая функция в импульсном представлении

$$a_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}$$

Уравнение Шрёдингера в импульсном представлении

$$\frac{p^2}{2m} \cdot a_p - \frac{\alpha}{2\pi\hbar} \cdot \left[e^{ipa/\hbar} \cdot C_+ + e^{-ipa/\hbar} \cdot C_- \right] = -|E| \cdot a_p$$


$$C_{\pm} = \int_{-\infty}^{\infty} dp' e^{\pm ip'a/\hbar} \cdot a_{p'}$$

Как решать?

1 шаг. Выразить a_p

2 шаг. Подставить в интегралы для C_{\pm}

3 шаг. Решить систему уравнений для C_{\pm}



$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi e^{ip\xi}}{(\xi + iz)(\xi - iz)} = 2\pi i \operatorname{res} f(\pm iz) = 2\pi i \cdot (\xi \boxtimes iz) f(\pm iz)$$

1 шаг. Выразить a_p

$$a_p = \frac{\alpha m}{\pi \hbar} \cdot \frac{1}{2mE + p^2} \cdot \left[e^{ipa/\hbar} \cdot C_+ + e^{-ipa/\hbar} \cdot C_- \right]$$

2 шаг. Подставить в интегралы для C_{\pm}

$$C_{\pm} = \frac{\alpha m}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{ipa}}{2mE + p^2} \cdot \left[e^{ipa} \cdot C_{+} + e^{-ipa} \cdot C_{-} \right]$$

3 шаг. Решить систему уравнений для C_{\pm}

$$\begin{cases} C_+ = \frac{\xi}{\gamma} (C_+ + e^{-2\gamma} \cdot C_-) \\ C_- = \frac{\xi}{\gamma} (e^{-2\gamma} \cdot C_+ + C_-) \end{cases}$$

$$\gamma = ka, \quad \xi = \frac{m\alpha a}{\hbar^2}$$

Условие для энергии

$$\frac{\gamma}{\xi} = 1 \pm e^{-2\gamma}$$

Волновые функции?

Волновые функции

$$C_+ = \pm C_-$$

Явный вид волновых функций?

Явный вид волновых функций

$$a_p = \frac{\alpha m}{\pi \hbar} \cdot \frac{1}{2mE + p^2} \cdot \left[e^{ipa/\hbar} \cdot C_+ + e^{-ipa/\hbar} \cdot C_- \right]$$

Или

$$a_p^{(\pm)} = \frac{A^{(\pm)}}{2mE + p^2} \cdot \begin{cases} \cos\left(\frac{pa}{\hbar}\right) \\ \sin\left(\frac{pa}{\hbar}\right) \end{cases}$$