


# **СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА**



СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СВОЕВРЕМЕННОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК МЕСТНОГО, ТАК И ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ



# Техника инстилляций капель в конъюнктивальный мешок

Оснащение: перчатки, глазные пипетки (2шт), ватно-марлевые шарики (2шт), лоток

Этапы	Последовательность действий
<b>Подготовка к процедуре, обеспечение инфекционной безопасности.</b>	1. Представиться, объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры и получить его согласие.
	1. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки.
	1. Предложить пациенту принять удобное положение или придать ему удобное положение.
<b>Выполнение процедуры.</b>	1.Набрать лекарство в пипетку.
	2.Оттянуть н\веко стерильным шариком, пациент смотрит вверх
	3.Закапать капли в н\свод, не касаясь ресниц
	4.Попросить пациента закрыть глаза
	5.Аналогично провести манипуляцию со вторым глазом
	6. Сбросить шарики и пипетки в емкость с дезинфектантом.
	7. Придать удобное положение пациенту
<b>Окончание процедуры</b>	1. Снять перчатки, сбросить их в дезинфектант
	2. Вымыть и осушил руки.
	3. Обработать руки антисептическим средством.

## «Закладывание глазных мазей»

Оснащение: туба с глазной мазью, ватно-марлевые шарики(2шт)

Этапы	Последовательность действий
<b>Подготовка к процедуре, обеспечение инфекционной безопасности.</b>	1.Представиться, объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры и получить его согласие.
	2.Вымыть и осушить руки, надеть перчатки.
	3.Предложить пациенту принять удобное положение или придать ему удобное положение.
<b>Выполнение процедуры</b>	1.Выдавить мазь из тюбика на глазную палочку.
	2.Оттянуть н\веко стерильным шариком, пациент смотрит вверх
	3.Заложить мазь в н\свод не касаясь ресниц в направлении от наружного угла глаза к внутреннему.
	4. Предложить пациенту сомкнуть веки, удалил излишки мази и провел круговой массаж век.
	5.Сбросить шарик и глазную палочку в емкость с дезинфектантом.
	6. Аналогичные действия повторить со вторым глазом
	7.Придать пациенту удобное положение
<b>Окончание процедуры</b>	1.Снять перчатки, сбросить их в дезинфектант
	2.Вымыть и осушить руки.
	3.Обработать руки антисептическим средством.

# СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА

-УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА ВКЛЮЧАЕТ СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЩАДЯЩЕЙ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ БОЛЬНОГО, ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В САМООБСЛУЖИВАНИИ, В ПРОВЕДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ВЫПОЛНЕНИИ РЯДА СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАЗНАЧЕНИЙ (ЗАКАПЫВАНИЕ КАПЕЛЬ, ЗАКЛАДЫВАНИЕ МАЗИ, НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ НА ГЛАЗ И ДР.).

-ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОСТОРОЖНО, БЕЗ ИЗЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО.

-ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫМИ.

-В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТУ НАКАНУНЕ ОПЕРАЦИИ ПОДСТРИГАЮТ РЕСНИЦЫ.

- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ.

- ПО ОКОНЧАНИИ ОПЕРАЦИИ ЕМУ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ НА ОБА ГЛАЗА (БИНОКУЛЯРНУЮ) ИЛИ НА ОДИН ГЛАЗ (МОНОКУЛЯРНУЮ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЮТ ВЕКИ ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОДУШЕЧКОЙ, КОТОРУЮ ФИКСИРУЮТ ЗАТЕМ БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ ИЛИ ПОЛОСКАМИ ЛИПКОГО ПЛАСТЫРЯ ШИРИНОЙ 0,5 СМ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОД УГЛОМ ДРУГ К ДРУГУ ИЛИ КРЕСТООБРАЗНО.



#### 4. ПРОПИСИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

1. ПРЕПАРАТЫ ТИПА "ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА":

RP.: LACRISYN - 15.0 ML.

D.S. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ. ПО 2 КАПЛИ В ОБА ГЛАЗА 4-6 РАЗ В ДЕНЬ. ПРИМЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ 5-10 МИН. ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ СЛЕЗЫ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ.

RP.: POLYGLUCINI - 15.0 ML.

D.S. РАСТВОР ДЛЯ АДАПТАЦИИ К МЯГКИМ КОНТАКТНЫМ ЛИНЗАМ. ЗАКАПЫВАТЬ НА ОДЕТУЮ КОНТАКТНУЮ ЛИНЗУ ПО 1 -2 КАПЛИ 4-6 РАЗ В ДЕНЬ. ПОКАЗАНИЕМ К ПОВТОРНОМУ ЗАКАПЫВАНИЮ ПРЕПАРАТА СЛУЖИТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ В ГЛАЗУ.

2. ГЛАЗНЫЕ МАЗИ И ГЕЛИ:

RP.: UNG. LAEVOMYCETINI 5% -10.0.

D.S. ГЛАЗНАЯ МАЗЬ. ЗАКЛАДЫВАТЬ ЗА НИЖНЕЕ ВЕКО 4-6 РАЗ В ДЕНЬ И НА НОЧЬ.

RP.: GELE SOLCOSERYLI 20% - 20.0.

D.S. ЗАКЛАДЫВАТЬ ЗА НИЖНЕЕ ВЕКО 3-4 РАЗА В ДЕНЬ И НА НОЧЬ.

3. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

RP.: SOL. CITRALI 0.01% - 10.0 ML.

D.S. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ.

ПО 2 КАПЛИ 2-4 РАЗА В ДЕНЬ (ПРИ НАЛИЧИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИЛИ ДИСТРОФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КОНЪЮНКТИВЕ И РОГОВИЦЕ).