

Общая рецептура

Таблетки, драже, капсулы

- Rp.: Tabulettam Acidi acetylsalicylici 0,5
 - D.t.d. N.10
 - S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды.
-
- Dragee

- Rp.: Acidi acetylsalicylici 0,5
- D.t.d. N.10 in tabulettis
- S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды.

- in capsulis gelatinosis

Мази

- Rp.: Unguenti Oxolini 0,25% - 10,0
- D.S. Наносить на слизистую оболочку носа 2 раза в день.

Суппозитории

- Rp.: Suppositorium cum Nystatino 250 000 ЕД
 - D.t.d. N. 20
 - S. По 1 суппозиторию 2 раза в день.
-
- Творительный падеж (**Ablativus**) после cum

Растворы

- Rp.: Solutionis Promedoli 2% —1 ml
- D.t.d. N. 3 in ampullis
- S. Вводить подкожно по 1 мл.

- Rp.: Insulini 5 ml (a 40 ЕД - 1 ml)
- D.t.d. N. 3
- S. Вводить подкожно по 12 ЕД перед завтраком, 18 ЕД перед обедом, 6 ЕД перед ужином.

- Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5
- D.t.d. N. 30
- S. Содержимое флакона перед употреблением растворить в 3 мл 0,5% раствора новокаина. Вводить внутримышечно 2 раза в день.

Аэрозоль

- Rp.: Aerosolum «Ephatinum» N. 1
- D.S. Вдыхать по 2 дозы 3 раза в день.

- Rp.: Coffeinum-natrii benzoatis 1,2
- Natrii bromidi 6,0
- Aquae destillatae ad 180 ml
- M.D.S. Принимать внутрь по
- 1 столовой ложке 3 раза в день.

- *Olei*
- *Mucilaginis*
- *Amyli*
- *Aquae destillatae*
- *Suspensionis*
- *Emulsi*
- *Infusi* - настой
- *Decocti* - отвар
- *Pilula* |ae
- *Trochisci* - пастилку
- *Capsulis*

Tincturae
Extracti
Linimenti
Unguenti
Vaselini
Pastae
Suppositorium |ia
Emplastrum
Tabulettam |as
Granuli |orum