

ВИЧ-инфекция и СПИД:

Знать, чтобы жить!

- 
- **В** – вирус
 - **И** – иммунодефицита
 - **Ч** – человека

 - **С** – синдром (симптомы одной болезни)
 - **П** – приобретенного
 - **И** – иммуно (невосприимчивость)
 - **Д** – дефицита (недостаток)

Стадии развития ВИЧ и СПИД в организме человека

- **0-я стадия:** бессимптомное развитие вируса
- **1-я стадия:** первые симптомы в слабой форме, можно определить болезнь по анализам
- **2-я стадия (преСПИД):** усиление прежних СИМПТОМОВ
- **3-я стадия(типичный СПИД):** резкое обострение болезни, +новые инфекции
- **4-я стадия(острый СПИД):** финальное обострение, смерть человека

История возникновения:

- ВИЧ был впервые зафиксирован медиками США среди своих граждан
- ВИЧ распространялся в американской среде в условиях «ЛГБТ-революции» и активного употребления наркотических веществ.
- ВИЧ был привезен в США из Гаити, где сначала и развился
- Изначальная прародина вируса — Африка

Гипотезы возникновения ВИЧ:

- 1. Африканская гипотеза*
(Вирус возник в среде шимпанзе, с которыми активно контактировал человек)



2. Широкое использование научных достижений XX века

*(переливание крови,
пересадка органов и другие
открытия)*



*3. Искусственное
возникновение вируса*
**(бактериологическое
оружие)**



4. Мутация другого вируса в ВИЧ

**(существование вируса с
древних времен)**

Фазы распространения ВИЧ-инфекции

- **Начальная фаза** – распространение ВИЧ идет в основном в среде лиц гомосексуальной ориентации;
- **Вторая фаза** – вирус попадает в среду лиц, использующих наркотики внутривенно и распространяется кровяным путем;
- **Третья фаза** – когда в процесс вовлекается все население и распространение ВИЧ осуществляется преимущественно половым путем.



Пути передачи ВИЧ от зараженного человека:

1. При половом контакте
(гетеросексуальный, гомосексуальный)




2. Через контакт с зараженной кровью

- Инъекции наркотиков инфицированными шприцами;
- Переливание не обследуемой крови;
- Медицинские манипуляции.



3. Вертикальный (от матери к ребенку) – 15 – 30 %

- Внутриутробно;
- Во время родов;
- При грудном вскармливании.





В 1988 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) приняла решение – Всемирный день борьбы со СПИДом будет отмечаться ежегодно 1 декабря. В этот день необходимо довести до всеобщего сведения главную идею, что самая дешевая и эффективная мера борьбы с этой болезнью – санитарное просвещение и информирование населения.

6 правил безопасного поведения:

- **1)Никогда не принимай наркотики**
- **2)Не используй не стерильные инструменты на себе и не давай этого делать на себе людям**
- **3)Используй свои личные чистые инструменты для своих нужд**
- **4)Соблюдай личную гигиену**
- **5)если есть подозрение на ВИЧ, сделай анализ**
- **6)Предохраняйся при сексе**



**Спасибо за
внимание!**