

# F 20.8 Другой тип шизофрении

- F20.8xx1 Ипохондрическая sch
- F20.8xx2 Сенестопатическая sch
- F20.8xx3 Детский тип sch
- F20.8xx4 Атипичные формы sch

F20.8xx8 Sch других установленных типов



- F20.8

## **Other schizophrenia**

- Cenesthopathic schizophrenia
- Schizophreniform:  
disorder NOS "not otherwise specified"  
psychosis NOS "not otherwise specified"
- Excl.: brief schizophreniform disorders (F23.2)

- F20.9

*Schizophrenia, unspecified*

F20.8xx1 Ипохондрическая sch

F20.8xx2 Сенестопатическая sch

Клиника, течение сенестопатической шизофрении. Аналитический разбор.

<https://cyberleninka.ru/article/n/klinika-techenie-senestopaticheskoy-shizofrenii-analiticheskiy-obzor>

# F20.8xx3 Детский тип шизофрении

Формирование олигофреноподобного дефекта



Отечественная  
систематика форм  
течения  
шизофрении

МКБ-10

Непрерывнотекущая ДШ

Злокачественная

Близкая к параноидной

Вялотекущая:

Неврозоподобная

Психопатоподобная

Простая

Шизофрения (детский тип)  
F20.8xx3

Шизофреническое  
расстройство  
F21

Приступообразно-прогредиентная  
ДШ:

Близкая к  
злокачественной

Близкая к параноидной

Близкая к неврозоподобной  
малопрогредиентной

F20.x1 Шизофрения  
приступообразно-прогредиентный  
тип течения с нарастающим  
дефектом

F20.x2 Шизофрения  
приступообразно-прогредиентный  
тип течения со стабильным дефектом

Рекуррентная ДШ

Шизоаффективное расстройство  
F25

# Злокачественная ДШ

- Аутистический дизонтогенез
- Минифестация в 2-5 лет
- Регресс, остановка психического развития, аутизм
- "+" кататоническая
- Непрерывно-прегрессиентное течение
- В первый 1,5 года формируются стойкого олигофреноподобного дефекта (псевдоорганического)

# Близкая к параноидной

- Возраст 7-9 лет – 10-14 лет
- Бредоподобное фантазирование -> бред воображения -> бредовые идеи отношения и преследования ->
- Непрерывно-прогредиентное течение
- Формирование олигофреноподобного дефекта

-Страх  
-Тревога  
-Выраженное  
психомоторное  
возбуждение  
-Агрессивность  
-Враждебность

Галлюцинаторн  
о-  
параноидная  
симптоматика

Гебефреническая  
симптоматика

Неврозоподобная  
симптоматика  
(обсессивно-  
компульсивные  
расстройства,  
истероформные и др)  
Соматовегетативные  
нарушения

*Выраженный  
седативный  
компонент*

-хлорпромазин  
-левомепромазин  
-хлорпротиксен  
-клозапин  
+

*Транквилизаторы*  
-диазепам  
-лоразепам

*Антигаллю-  
цинаторный,  
антибредовой  
эффект*

-галоперидол  
-трифлуоперазин  
-рисперидон

*Антипсихотическое  
действие*

-тиопроперазин  
-зуклопентиксол  
  
-клопиксол  
-рисперидон

-алимемазин

*Антидепрессанты*

-сертралин  
-кломипрамин  
-флувоксамин

*Транквилизаторы*

-клоназепам  
-диазепам

*Как лечить?*

**-купирующая  
терапия**

-стабилизирующая т. (не менее  
1года)  
-профилактическая т.

# Список используемой литературы

- ПСИХИАТРИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО, 2-е издание. Главные редакторы чл.-кор. РАН Ю.А. Александровский, проф. Н. Г. Незнамов
- <https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F23.2>
- <http://ncpz.ru/lib/1/book/14/chapter/4>

