

F 20.8 Другой тип шизофрении

- F20.8xx1 Ипохондрическая sch
- F20.8xx2 Сенестопатическая sch
- F20.8xx3 Детский тип sch
- F20.8xx4 Атипичные формы sch

F20.8xx8 Sch других установленных типов



- F20.8

Other schizophrenia

- Cerebrovascular schizophrenia
- Schizophreniform:
disorder NOS "not otherwise specified"
psychosis NOS "not otherwise specified"
- Excl.: brief schizophreniform disorders (F23.2)

- F20.9

Schizophrenia, unspecified

F20.8xx1 Ипохондрическая sch

F20.8xx2 Сенестопатическая sch

Клиника, течение сенестопатической шизофрении. Аналитический разбор.

<https://cyberleninka.ru/article/n/klinika-techenie-senestopaticheskoy-shizofrenii-analiticheskiy-obzor>

F20.8xx3 Детский тип шизофрении

Формирование олигофреноподобного дефекта



Отечественная
систематика форм
течения
шизофрении

МКБ-10

Непрерывнотекущая ДШ

Злокачественная

Близкая к параноидной

Вялотекущая:

Неврозоподобная

Психопатоподобная

Простая

Шизофрения (детский тип)
F20.8xx3

Шизофреническое
расстройство
F21

Приступообразно-прогредиентная
ДШ:

Близкая к
злокачественной

Близкая к параноидной

Близкая к неврозоподобной
малопрогредиентной

F20.x1 Шизофрения
приступообразно-прегредиентный
тип течения с нарастающим
дефектом

F20.x2 Шизофрения
приступообразно-прегредиентный
тип течения со стабильным дефектом

Рекуррентная ДШ

Шизоаффективное расстройство
F25

Злокачественная ДШ

- Аутистический дизонтогенез
- Минифестация в 2-5 лет
- Регресс, остановка психического развития, аутизм
- "+" кататоническая
- Непрерывно-прегрессиентное течение
- В первый 1,5 года формируются стойкого олигофреноподобного дефекта (псевдоорганического)

Близкая к параноидной

- Возраст 7-9 лет – 10-14 лет
- Бредоподобное фантазирование -> бред воображения -> бредовые идеи отношения и преследования ->
- Непрерывно-прогредиентное течение
- Формирование олигофреноподобного дефекта

-Страх
-Тревога
-Выраженное
психомоторное
возбуждение
-Агрессивность
-Враждебность

Галлюцинаторн
о-
параноидная
симптоматика

Гебефреническая
симптоматика

Неврозоподобная
симптоматика
(обсессивно-
компульсивные
расстройства,
истероформные и др)
Соматовегетативные
нарушения

*Выраженный
седативный
компонент*

-хлорпромазин
-левомепромазин
-хлорпротиксен
-клозапин
+

Транквилизаторы
-диазепам
-лоразепам

*Антигаллю-
цинаторный,
антибредовой
эффект*

-галоперидол
-трифлуоперазин
-рисперидон

*Антипсихотическое
действие*

-тиопроперазин
-зуклопентиксол

-клопиксол
-рисперидон

-алимемазин

Антидепрессанты

-сертралин
-кломипрамин
-флувоксамин

Транквилизаторы

-клоназепам
-диазепам

Как лечить?

**-купирующая
терапия**

-стабилизирующая т. (не менее
1года)
-профилактическая т.

Список используемой литературы

- ПСИХИАТРИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО, 2-е издание. Главные редакторы чл.-кор. РАН Ю.А. Александровский, проф. Н. Г. Незнамов
- <https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F23.2>
- <http://ncpz.ru/lib/1/book/14/chapter/4>

