



# \* ЦИСТИТ



Цистит (от греч. κύστις — пузырь) — воспаление мочевого пузыря. В урологической практике термин «цистит» часто используют для обозначения симптоматической мочевой инфекции, с воспалениями слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушением его функции, а также изменениями осадка мочи.



Цистит – это болезнь, свойственная всем возрастам. Вызывают ее преимущественно следующие причины: переохлаждение тазовых областей; травмы слизистой мочевого пузыря; сидячий образ жизни; острая и жирная пища; наличие хронических гинекологических или венерических заболеваний; наличие очагов инфекции в организме; незащищенный секс; недостаток гигиены







Различают первичный и вторичный, острый и хронический, инфекционный (специфический или неспецифический) и неинфекционный (химический, термический, токсический, аллергический, лекарственный, лучевой, алиментарный и др.) цистит. Вторичный цистит развивается на фоне заболеваний мочевого пузыря (камни, опухоль) или близлежащих органов (аденома и рак предстательной железы, стриктура уретры, хронические воспалительные заболевания половых органов). Цистит с преимущественной локализацией воспалительного процесса в области мочепузырного треугольника обозначают термином «тригонит».







# ЦИСТИТ



Лечение должно заключаться в устранении причины, а причина цистита — микробное воспаление, возникшее на фоне ослабленного иммунитета. То есть полноценное лечение цистита должно включать в себя: антибактериальные препараты; противовоспалительные средства; средства, укрепляющие иммунитет.

Традиционные препараты для лечения цистита — фурагин, бисептол — их эффективность подтверждена годами.





*Спасибо  
за внимание!*