16. Приведите разнообразные примеры квадратичной зависимости

Квадратичная зависимость:

$y = ax^2$, где a - постоянное число, $a \neq 0$.

Зависимость площади квадрата от длины его стороны



$$S = a^2$$

Зависимая переменная

Независимая переменная

$$y = x^2$$

квадратичная функция

- Квадратичные зависимости в геометрии начинаются с теоремы Пифагора. Суть теоремы – *квадратичная* зависимость квадрата гипотенузы от каждого из катетов.



Квадратичные зависимости в природе, быту, науке

- Такие зависимости использовались ещё при строительстве египетских пирамид. В папирусе, написанном около 1650 г. до н. э., описывается формула для объёма усечённой пирамиды с квадратным основанием (какие строили египтяне)

$$V = \frac{h}{3}\left(a^2 + ab + b^2\right)$$

- Где a, b - длины сторон квадратов, h - высота пирамиды.



- А квадратные уравнения решались ещё раньше. Их решали вавилоняне времён Хаммурапи (1950 г. до н.э.), т.е. более четырёх тысяч лет тому назад. Решения описывались на глиняных табличках, и, конечно, **не в виде формул**, а в виде довольно пространного словесного перечисления последовательности действий.

Впервые квадратное уравнение сумели решить математики Древнего Египта. В одном из математических папирусов содержится задача:

- Путь, пройденный телом, при его равноускоренном движении, в зависимости $S = Vt + \frac{at^2}{2}$ t:

- Свободно падающие тела (пули, снаряды, камни) движутся по параболической траектории $y = ax^2 + bx + c$, причём а<0, если ось у направлена вверх. Такие траектории называются *баллистическими*.
- Гагарин впервые летел по круговой траектории, а не по баллистической, чем и прославился. Параболическую же форму имеют и орбиты *комет*, прибывающих из *глубокого* космоса (такие кометы не возвращаются).



- *Кинетическая энергия - квадратичная* функция скорости тела.

$$E_к = \frac{m\upsilon^2}{2}$$

- Аналогичный квадратичный закон верен для вращательного движения твёрдых тел (на чём основана теория волчка и всевозможных *гироскопов*), а также для движения жидкости (на чём основана наука *гидродинамика*).

- Квадратичный вид имеет также энергия электрического и магнитного полей. Именно, *благодаря квадратичной зависимости* этой энергии от полей распространяются радиоволны и свет, так как именно такая зависимость является причиной возникновения гармонических *колебаний*

Энергия электрического поля запасается между обкладками конденсатора *C*:

$$\boxed{W_{эл.п.} = \frac{Q^2}{2C}.}$$

Энергия магнитного поля сосредоточена в катушке *L*:

$$\boxed{W_{м.п.} = \frac{LI^2}{2} = \frac{L\dot{Q}^2}{2}.}$$

- Риманову геометрию применил Эйнштейн и построил теорию относительности. Эта теория предсказала *чёрные дыры* во Вселенной, которые обнаружены астрономами, использующими космический телескоп-спутник имени Хаббла, опять же с *параболическим* зеркалом. В основе и чёрных дыр и телескопа лежит *квадратичная* зависимость!



Телеско
п "Хаббл
"





- В основе атомной бомбы также лежит *квадратичная* зависимость, геометрически связанная с теоремой Пифагора.
- Площади круга и сферы квадратично зависят от радиуса.





- В сечении спутниковые «тарелки» и отражатели гигантских радиотелескопов имеют форму параболы

Частота хроматидных обменов имеет квадратичную дозовую зависимость

- $Y=c+\beta*D^2$



Квадратичная дозовая зависимость соответствует двуударному механизму формирования обменов (NHEJ).

6. Гауссу, работавшему в Брауншвейговской обсерватории, потребовалось решить задачу, наподобие такой: найти *одно* неизвестное x из системы *четырёх* (или из сотни) линейных уравнений

$$a_1x+b_1=0,\ a_2x+b_2=0,\ a_3x+b_3=0,\ a_4x+b_4=0,$$

если известно, что все эти уравнения должны выполняться лишь *приближённо*, как это бывает в практике. Решение Гаусса таково: x - это точка минимума квадратного трёхчлена

$$y=ax^2+bx+c=(a_1x+b_1)^2+(a_2x+b_2)^2+(a_3x+b_3)^2+(a_4x+b_4)^2.$$

- Этот метод, в его обобщённом варианте, используется сейчас практически *всеми учёными* везде, где есть неточные результаты измерений, где нужна *статистика*

Полностью указать, где сейчас используются квадратичные зависимости – это примерно то же, что и перечислить все романы, где используется буква А.

- В заключение следует подчеркнуть роль квадратичных зависимостей для науки. Если нет точной квадратичной зависимости, учёные (математики, физики, химики) часто решают задачу не точно, а приближённо, используя компьютеры и *заменяя сложные зависимости квадратичными*. Например, таким путём получаются многие методы приближённых вычислений

Статья А.Н. Макарова

«Квадратичные зависимости в природе, быту, науке»

Национальный университет кораблестроения

https://science-nuk.ru/work11nshots=1