

Терапиялық стоматологиядағы
жедел –жәрдем кажет ететін
жағдайлар

Доцент Сапаева Н.Ғ.

- **Анафилактический шок** (по классификации А.Г. Брусиловского, 1974 г.).
- – молниеносная форма (10 минут) – может проходить без предвестников и с предвестниками;
- – немедленная форма (40 минут), может проявляться в 5 вариантах: кожный, астмоидный, церебральный, кардиогенный, абдоминальный;
- – замедленная форма (до 3-х часов), характеризующаяся комбинированным вариантом.
- Способы лечения анафилактического шока: – коррекция артериального давления, устранение бронхоспазма;
- – подавление выработки и высвобождения медиаторов аллергии;
- – блокада тканевых рецепторов, взаимодействующих с медиаторами аллергии;
- – элиминация аллергена.
- Рекомендуемый состав аптечки в стоматологии:
- – 0,1 р-р адреналина гидрохлорида – 1 уп.;
- – 0,9% р-р хлористого натрия – 1 фл.;
- – 40% р-р глюкозы – 1 уп.;
- – 0,1% р-р норадреналина – 1 уп.;
- – 1% р-р мезатона;
- – 2-4% р-р эуфиллина – 1 амп.;
- – 5% р-р глюкозы – 500 мл;
- – 0,1 % р-р атропина сульфата – 10 ампул;
- – 0,05% р-р строфантина – 10 ампул;
- – преднизолон 30 мг – 1 уп. или дексаметазон 4 мг – 1 уп.;
- – 2% р-р лазикса – 10 ампул;
- – 0,1% р-р тавегила или 2,5% р-р супрастина – 1 уп.;
- – жгут резиновый;
- – системы для внутривенного вливания – 2 шт.
- – спирт этиловый – 50 мл.

● **Ангионевротический отек Квинке (описан в 1882 г.)**

● Патогенез

● 1. Реагиновый. цитотоксический. иммунокомплексный типы

Талма (обморок) –қысқа уақытқа созылатын кенеттен есін жоғалту

- Липотимия
- Қарапайым талма
- Құрыспалы талма
- Симптоматикалық талма

Жедел-жәрдем

- Басын томендетіп шалқасынан жатқызу, бетіне суық су шашіп, мақта анжымен мүсәтір спиртімен самайын сүрту
- Тері астына 1 мл 10% кофеин ерітіндісін немесе 2 мл кордиаминенгізеді
- 5% эфедрин, 1% мезатон ерітінділерді 1 мл ден

Коллапс- тамырдың тонусының төмендеуімен, мидың оттегінің жетіспеушілігімен сипатталатын қан тамырында қанның азаю түрі

- Бозару,суық тер, теріде мраморлық суреттің болуы, тахикардия, есі жоғалмайды, АҚ томендеген
-

Анафилактикалық шок
аллергиялық реакцияның
реагиндік түрі, дәрі-дәрмекті
парентеральды еңгізгенде дамиды

- Гемодинамикалық
 - Асфиксиялық
 - Церебральды
 - Абдоминальды
-

Анафилактикалық шоктың ағымы

- Жедел қатерлі ағым
 - Жедел қатерсіз
 - Созылмалы
 - Қайталамалы
 - Абортивті
-

Гемодинамикалық түрі

- АҚ көп төмендеген
 - Жүрек тұсында қатты ауру сезім
 - Аритмия
 - Пульс өте әлсіз немесе жоғалған
 - Перифериялық қан тамырларында спазм
 - Тері түсі мраморға ұқсас
-

Асфиксиялық түрі

- Кеңірдектің кілегей қабығы домбағады, ісінеді, тыныс жолы жартылай немесе долық жабылады
- Өкпеде әртүрлі дәрежедегі бронхоспазм
- Өкпедегі газ алмасу бұзылады

Церебральды түрі

- Орталық нерв жүйесіндегі өзгерістер-психоморлық қозу, қорқу
- Естің жоғалуы
- Құрысу
- Эпилепсикалық статус

Абдоминальды түрі

- Түйрей қадалған ауру сезімі асқазан үсті аймақта
- Іште ыңғайсыздық
- Жүре тұсындағы ауру сезіміне тән

Жедел-жәрдем

- Қан айналу және тыныс алудың жедел бұзылыстарын жою
- Антиген-антидене реакциясындағы биологиялық белсенді заттарды бейтараптау, тежеу
- Аллергеннің қан айналымынан жою
- Омірлік маңызды қызметерді қалпына келтіру