

ТРАХЕИТ



Трахеїт у дітей

Трахеїт у дітей - запалення трахеї, частини бронхіального дерева. Верхній її відділ межує з гортанню, а нижній - розгалужується в масу бронхів. В основному поєднується з хвороботворним процесом в інших прилеглих відділах дихальної системи, наприклад, ларинготрахеїт, трахеобронхіт і ін. **Виділяють такі види недуги:**

первинний;

симптоматичний супутній;

алергічний.



Причини

У дитячому віці є анатомічні особливості в будові
воздуховодного тракту, в тому числі і в цьому відрізку: добре
виражений підслизовий шар, хрящові трахеальні кільця
набагато м'якше і більш податливі при здавленні, насичені
нервовими закінченнями. Все це сприяє швидкому набряку,
обтурації і бурхливої відповідної кашлевої реакції.
Захворювання викликають переважно віруси, але може і
грибкова, мікробна флора.



СИМПТОМИ

У малюків до 2-3-х років цей сегмент дихальної трубки відносно короткий і швидко втягується в запалення, що виходить з інших відділів. Діти старшого віку можуть переносити трахеїт на тлі ГРЗ.

Для недуги характерні:

сухий нав'язливий кашель з тривалості нападів, який призводить до перенапруження м'язів грудної клітки і викликає хворобливі відчуття в ній;

температура;

болю в горлі;

нежить;


сльозотеча;

слабкість;

знижений апетит.


Полегшення настає через 4-5 днів при переході в фазу продуктивного відкашлювання.





Діагностика

Встановлюється діагноз на підставі симптомів, огляду і аускультатції пацієнта при консультації лікаря-педіатра або пульмонолога в дитячій поліклініці. Специфічні обстеження використовуються при підозрі на інтеркурентних захворювання: коклюш, туберкульоз, трахеобронхит, чужорідне тіло, пухлини, гастроєзофагального рефлюкс. Вони включають бактеріологічний посів, рентген органів, трахеобронхоскопію, езофагоскопію і т.д.



Лікування

Основне в терапії - пом'якшити кашель. Призначаються препарати, що пригнічують кашльовий рефлекс: глікодин, синекод, дигідрогеноцитратпісля з додаванням протинабрякових і бронхолитиків. У фазі вологого кашлю переходять на відхаркувальні препарати - бронхіпрет, лазолван, амброксол. Дасть ефект тепле лужне пиття, при наявності небулайзера - лужні інгаляції. Дозволені місцеві антисептики: трахісан, травісил, гексаліз. За свідченнями призначають протівірусні або імунокоректори. Лікування здійснюється на дому. Одужання відбувається до 10-14 дня.



Профілактика

Профілактика ґрунтується на наступних моментах:
обмежити контакти з хворими на ГРВІ;
дихати свіжим непересушеним повітрям, але не переохолоджуватися;
проводити гартують процедури;
ослабленим пацієнтам показані імуностимулюючі препарати;
заборонити куріння в дитячому оточенні;
не допускати гру дітей з шкідливими парами будь-яких речовин;
пам'ятати про можливість алергічного набряку;
малюкам перших років не дозволяти гру з дрібними предметами, щоб уникнути їх потрапляння в різні відділи легень.



Дякую за увагу!

