



Урогенитальный хламидиоз

ВЫПОЛНИЛА: ЯРОСЛАВОВА КСЕНИЯ СД199Б


Хламидиоз



От 5-15% сексуально активных людей заражены хламидийной инфекцией. Течение заболевания протекает без СИМПТОМНО



ХЛАМИДИЙНЫЙ АРТРИТ




ХЛАМИДИЙНАЯ ПНЕВМОНИЯ



УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ

ЗДОРОВАЯ КОНЬЮНКТИВА



КОНЬЮНКТИВИТ


ХЛАМИДИЙНЫЙ КОНЬЮНКТИВИТ

Пути передач


- Половой контакт
- Вертикальный путь
- Контактной-бытовой
- Инкубационный период от 2х недель- 1 месяц






Клинические проявления: у мужчин



У женщин



У детей



ОСЛОЖНЕНИЯ

- болезнь Рейтера(уретро-окулосинувиальный синдром)
- сужение мочеиспускательного канала
- орхоэпидимит
- хронический простатит
- ВЗОМТ
- офтальмохломидиоз
- поражение легких
- судороги, апноэ
- хломидийная пневмония новорожденных

Лечение и диагностика

