Отряд Сельдевые



Таблица 5. Сельдевые:

1 — атлантическая сельдь (Clupea harengus);
2 — шпрот (Sprattus sprattus);
3 — пузанок (Alosa caspia);
4 — сардина-пильчард, или европейская сардина (Sardina pilchardus);
5 — черноспинка (Alosa kessleri kessleri);
6 — каспийская килька (Clupeonella delicatula);
7 — менхэден (Brevoortia tyrannus);
8 — полосатая сардинка (Harengula humeralis);
9 — мачуэла (Opisthonema oglinum);
10 — шад (Alosa sapidissima);
11 — полосатая селедочка-кибинаго (Spratelloides gracilis);
12 — дальневосточная сардина (Sardinops sagax melanosticta);
13 — гильза (Hilsa reevesii);
14 — сельдь-круглобрюшка (Etrumeus teres);
15 — коносир (Konosirus punctatus);
16 — илиша восточная (Ilisha elongata).



Без названия





Таблица 20. Тресковые:

1 — сайка, или полярная тресочка (Boreogadus saida);
2 — путассу (Micromesistius poutassou);
3 — треска (Gadus morhua);
4 — минтай (Theragra chalcogramma);
5 — навага обыкновенная (Eleginus navaga);
6 — гадикулус, или большеглазая тресочка (Gadiculus argenteus);
7 — сайда (Pollachius virens);
8 — пикша (Melanogrammus aeglefinus);
9 — тресочка Эсмарка (Trisopterus esmarki);
10 — мерлуза европейская (Merluccius merluccius);
11 — мерланг (Odontogadus merlangus);
12 — налим (Lota lota);
13 — морской налим (Gaidropsarus mediterraneus);
14 — мольва обыкновенная (Molva molva);
15 — менек (Brosme brosme);
16 — американский морской налим (Urophycis chuss).

Тресковые





Таблица 14. Карповые:

1 — верхогляд (Erythroculter erythropterus);
2 — шемая (Chalcalburnus chalcoides);
3 — красноперка (Scardinius erythrophthalmus);
4 — черный амур (Mylopharyngodon piceus);
5 — язь (Leuciscus idus);
6 — пескарь обыкновенный (Gobio gobio);
7 — сазан (Cyprinus caspio);
8 — озерный гольян (Phoxinus percnurus);
9 — гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus);
10 — гольян обыкновенный в брачном наряде;
11 — монгольский краснопер (Erythroculter mongolicus);
12 — голый осман (Diptychus dybowskii);
13 — уклейка (Alburnus alburnus);
14 — желтощек (Elopichthys bambusa);
15 — дальневосточная красноперка (Leuciscus brandti) в брачном наряде.

Карповые

своеобразные рыбы, характерные наличием мешковидных выростов жаберной полости, служащих для временного дыхания воздухом. Рыбы эти, например анабасСемейство Лабиринтовые — своеобразные рыбы, характерные наличием мешковидных выростов жаберной полости, служащих для временного дыхания воздухом. Рыбы эти, например анабас нередко выползают на берег и даже залезают на деревья. Обитают в пресных и солоноватых водоёмах тропической Африки, Азии и островов Малайского архипелага. Некоторые виды, например гурами, используются как аквариумные рыбки.



Запишите домашнее задание