



Пегас

Лебедь

Денеб

Лира

Вега

Геркулес

Сев. Корона

Лисичка

Дельфин

Стрела

Малый Конь

Альтаир

Орел

Змееносец

ЗВЕЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ


СДЕЛАЙТЕ КОНСПЕКТ УРОКА

(Запишите в тетрадь основные понятия)

Посмотрите видео в <https://www.youtube.com/>

1. Наблюдая звёзды
2. Как ориентироваться по звёздам и выучить созвездия

В глубокой древности люди мысленно объединили звёзды в определенные фигуры (созвездия), которым дали имена героев греческих мифов и легенд, а также мифических существ, с которыми эти герои сражались.




Созвездие «Кит»
из атласа Гевелия


Созвездиями называются определенные участки звёздного неба, разделенные между собой строго установленными границами. Всего – 88 созвездий.




Ковш Большой Медведицы самая известная группа звёзд в Северном полушарии




Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в. до н.э. разделил на шесть звёздных величин. Самые яркие (их на небе менее 20) - звёзды первой величины. Едва различимые невооружённым глазом – звёзды шестой величины.



В каждом созвездии звёзды обозначаются буквами греческого алфавита в порядке убывания их яркости. Наиболее яркая в созвездии звезда обозначается буквой α (альфа), вторая по яркости - β (бета) и т.д.



Примерно 300 звёзд получили собственные имена арабского и греческого происхождения.




Средняя звезда в ручке ковша Большой Медведицы называется Мицар, что по-арабски означает «конь». Рядом с Мицаром можно видеть более слабую звёздочку четвёртой величины, которую назвали Алькор – «всадник». По этой звезде проверяли качество зрения у арабских воинов несколько веков назад.




По ковшу Большой Медведицы легко отыскать на небе Полярную звезду – α Малой Медведицы. Полярная – звезда второй величины и в число самых ярких звёзд неба не входит.




Блеск звезды – величина, характеризующая освещённость, которая создаётся звездой на плоскости, перпендикулярной падающим лучам. Единицей измерения блеска звезды служит звёздная величина.



Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда второй величины в 2,512 раза ярче звезды третьей величины. Несколько звёзд были отнесены к звёздам нулевой величины, потому что их блеск оказался в 2,512 раза больше, чем у звёзд первой величины.



Самая яркая звезда ночного неба – Сириус (α Большого Пса) получила отрицательную звёздную величину -1,5.




Телескоп «Хаббл» позволил получить изображение предельно слабых объектов – до тридцатой звездной величины.



Star chart background with constellations and star names in Russian: Лебедь, Денеб, Лира, Вега, Геркулес, Сев. Корона, Пегас, Писидия, Дельфин, Орел, Альтаир, Малый Конь, Змееносец.

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ И ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в восточной части звёздного неба, другие находятся высоко над головой, а третьи скрываются за горизонтом в западной стороне (заходят).



Кажущееся вращение звёздного неба вызвано вращением Земли.

На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности. Общий центр всех дуг находится неподалеку от Полярной звезды. Точка в которую направлена ось вращения Земли называется – Северный полюс мира.




Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за сутки, то на фотографии получились бы полные окружности – 360° .


Сутки – это период полного оборота Земли вокруг своей оси. За час Земля повернется на $1/24$ часть окружности, т.е. на 15° .





Положение точки на Земле однозначно определяется географическими координатами – долготой (λ) и широтой (φ).




Положение светила на небе однозначно определяется экваториальными координатами – прямым восхождением (α) и склонением (δ)




Экваториальные координаты аналогичны географическим координатам (географическая широта и долгота – соответственно склонение и прямое восхождение, земная параллель – небесная параллель, Гринвичский меридиан – нулевой круг склонения). Но если географические координаты рассматриваются на реальной земной сферической поверхности, то экваториальные координаты – на воображаемой поверхности небесной сферы.



В экваториальной системе координат положение звезды связано с небесным экватором (пересечение плоскости земного экватора с небесной сферой), Северным и Южным полюсами мира (точки пересечения земной оси с небесной сферой) и эклиптической (видимый путь Солнца, пересекающего небесный экватор в марте в точке весеннего равноденствия).




Положение звезды X указывается координатами – прямым восхождением α (угловое расстояние вдоль небесного экватора от точки весеннего равноденствия Υ до направления на звезду) и склонением δ (угловое расстояние от небесного экватора вдоль большого круга, проходящего через полюсы мира).




Прямое восхождение измеряется в часах и может быть только положительной величиной, склонение – в градусах и может принимать как положительное, так и отрицательное значение.

Величина прямого восхождения одного и того же светила не меняется вследствие суточного вращения небосвода и не зависит от места наблюдений на поверхности Земли.

Из-за вращения Земли 15° соответствует 1 ч, а 1° – 4 мин, поэтому прямое восхождение равное 12 ч. составляет 180° , а 7 ч 40 мин – 115° .



Склонение считается положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора, отрицательным – у расположенных к югу от него.



Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, поэтому система экваториальных координат используется при создании звёздных глобусов, карт и атласов.




На звёздном глобусе изображаются не только звёзды, но и сетка экваториальных координат.

Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии широкое распространение получили карты и атласы звёздного неба.

КАРТА ЗВЁЗДНОГО НЕБА

Для общеобразовательных учреждений



Яркость звёзд

Самые яркие звёзды

Звезда	Сопоставление
Сиренус	Маленький палец
Капелла	Большой палец
Мирзат	Волосы
Мерак	Лодка
Капелла	Волосы
Поларис	Маленький палец
Альдебаран	Собака
Антарес	Палец
Антарес	Собака



Звёздное небо Готторнского глобуса (1644 г.), Северное полушарие

Температура звёзд

горячие	холодные
до 35 000 °C	как Регул в Лье
до 10 000 °C	как Сиренус и Большой Палец
до 6000 °C	как Вега в Лире
до 6000 °C	как Капелла в Волосы
до 4000 °C	как Арктур в Волосы
до 3000 °C	как Бетельгейзе и Сириус



Лев



Дева

По размеру среди звёзд можно выделить

гиганты	Большое Солнце, звезда в сотне раз	самый Большой звезда, красный гигант в 200 и более раз больше Солнца
карлики	меньшее Солнце, звезда в 100 раз	самый маленький звезда, ЗВЕЗДА-КАРИКУЛА в 100 раз меньше Солнца

Размеры звёзд-карликов в сравнении с Землёй



Солнце в сравнении со звёздами-гигантами и сверхгигантами

