

«Астана Медицина Университеті»АҚ

Тақырыбы: Дәрі-дәрмектермен шақырылған қызба

Орындаған: Алтыбаева М.О

Тексерген:

Жоспар

Кіріспе: Дәрі-дәрмекпен шақырылған қызбаға түсінік

Негізгі бөлім

*Этиологиясы

*Қызбаға алып келуші факторлар

*Симптомдары

*Диагностикасы

*Емі

Қорытынды:

Дәрі дәрмекпен шақырылған қызба — дегеніміз антибиотик қабылдаған кезде пайда болып, егер басқа да қызбаны шақыратын себептер болмаса, антибиотикті қабылдауды тоқтатқанда бысылатын қызбаның түрі. Дәрі-дәрмекпен шақырылатын қызба антибиотикке шақырылатын жалғыз аллергиялық көрініс болып табылады. Патогенезі толық зерттелмеген, ең болжамдысы иммунокомплекті механизм болып табылады.

**Жиі дәрі-дәрмектік қызбаны шақырушы
Антибиотиктер:**

* β -лактамдар,

*хлорамфеникол,

*сульфаниламидтер,
стрептомицин.

Дәрі-дәрмекпен шақырылған қызбаға алып келуші факторлар:

*Бір мезетте науқасқа бірнеше препараттарды енгізу ;

*Анамнезінде түрлі дәрілік заттарға аллергиясы бар екендігі көрсетілсе, көбіне әйел адамдар мен қарттарда болады.

Қалыптыда дәрі-дәрмекпен шақырылған қызба терапия басталғаннан соң пайда болып, препаратты тоқтатқаннан ейін 48-72 сағат ішінде басылады. Дегенмен антибиотикті қайта енгізген кезде бірнеше сағат ішінде дамуы мүмкін.

Дәрі-дәрмекпен шақырылған қызбаның симптомдары:

- * 39,0-40,0 градусқа дене қызуының жоғарылауы
- * Салыстырмалы брадикардия
- * Эозинофилия
- * Лейкоцитоз
- * Тромбоцитопения
- * Қышыну
- * Бөртпелер

Бөртпелердің, терінің қышуы іэозинофилияның болуы дәрі-дәрмекпен шақырылған қызбаның иммунды генезін көрсетеді. Егер температура дәрі-дәрмекті қабылдауды доғарғанда төмендесе және қайта енгізгенде қызбаның рецидиві болса диагноз анық деп саналады.

Диагностикасы:

Дәрі дәрмекпен шақырылатын қызбаның диагностикасы қиынға соғады. Себебі көріністері басқа да генезбен шақырылған қызбалардан ажырату мүмкін емес.

Дәрі-дәрмектік қызба ремиттирлеуші, интермиттирлеуші, екі толқынды, гектикалық, субфебрильді болуы мүмкін. Өзге де симптоматикалармен қатар жүреді-бас ауруы, қалтырау, миалгия. Дәрі-дәрмектерді қабылдауды тоқтатқанда симптомдар жойылады.

Қызбаның терапиясында міндетті түрде қызбаны шақыратын антибиотикті доғару керек. Сирек жағдайларда ауыр жүйелі реакция кезінде және ішкі ағзалардың зақымдалуында глюкокортикоидтарды енгіземіз.

Назарларыңызға рахмет!