

СӨЖ

Тақырыбы: Медикаментозды ем

Орындаған: Мұқтасынова А

Тексерген: Ыбраевна Жания

ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯҒА АРНАЛҒАН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАР ТОПТАРЫ

- Антисептиктер
- Антибиотиктер
- Синтетикалық
- Бактерияға қарсы препараттар
- Стероид емес қабынуға қарсы препараттар
- Стероидты қабынуға қарсы препараттар
- Ферменттік препараттар
- Антигистаминдер
- Кальций препараттары
- Иммуномодуляторлар
- Витаминдер

АНТИСЕПТИКТЕР

Қолдану мақсаты-деңгейін төмендету
агрессивті әрекет
микроб бляшки микроорганизмдер
байланысты емдеудің барлық
инфекцияның тұрақты қаупі
жараның беті.

Шаю түрінде қолданылады,
ауыз ванналар, жуу және суару.



ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ

Негізгі ферменттік заттарға әсер етеді
жүйесі

Ақуыз денатурациясын тудырады

Өткізгіштігін бұзады

плазмалық мембрана

Органикалық қосылыстарды тотықтырады

Бактерицидті және дезодорантты

әрекет.

**АНТИСЕПТИК-ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР: СУТЕГІ АСҚЫН ТОТЫҒЫ
1%, КАЛИЙ ПЕРМАНГНАТЫ 0,5%**

- Бактерицидтік әсерге байланысты

болып табылатын Атом оттегін

белсенді тотықтырғыш

- Дезодорациялайтын, антисептикалық әсер

- Тұтқыр, гемостатикалық, ағартқыш,

каустикалық әрекет

Периодонтальды қалтада ірің болған кезде,

қан және басқа ақуыз өнімдері шығарылады

молекулалық оттегі, ол көбіктенеді

бөлінген, механикалық тазартуға ықпал етеді

Пародонтальды қалталар

ХЛОРГЕКСИДИНИ БАР ПРЕПАРАТТАРДЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ҚОЛДАНҒАНДА ЖАНАМА ӘСЕРЛЕР.

- * тістердің, тілдің артқы жағындағы бляшкаларды бояу;
- * протездерді бояу;
- * дәм сезімдерінің өзгеруі;
- * ауыз қуысының
микробиоценозының бұзылуы.

АНТИБИОТИКИ

<i>Линкомицина гидрохлорид</i>	Бактериостатическое, бактерицидное действие	Внутри капсулы по 500мг 3 раза в сутки Субмукозно 30%р-р в ампулах по 1мл (в/в, в /м)
<i>Клиндамицин</i>		Внутри капсулы по 150мг 4раза в сутки (в/в, в /м)
<i>Цифран СТ</i>	антибактериальное действие	Внутри по 1таб 2раза в день до еды(запивать большим количеством воды)

<p>Амоксиклав (аугментин, флемоклаб солютаб)</p> <p>Амоксициллин (флемоксин солютаб)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ЯНГ 2.Гноетечение из карманов, частые рецидивы 3.Пародонтальный абсцесс 4.Распространение инфекции на окружающие ткани с явлениями интоксикации 	<p>Внутри по 625мг (500мг амоксициллин и 125мг клавуновая к - та) 3 раза в сутки до еды</p> <p>Внутри по 500мг 3 раза в сутки до еды в течение 5 дней</p>
<p>Гентамицина сульфат4%</p>	<p>Применяется редко при заболеваниях пародонта</p>	<p>Внутримышечно по 1мл 2раза в день</p>

Сумамед

Макропен

Рулид

**Бактериостатическое,
бактерицидное,
антиоксидантное,
иммуномодулирующее
противовоспалительное действие**

Внутри по схеме- за
1 час до еды или
через 2 часа после
еды

Внутри по 400 мг
3 раза в день перед
едой

Внутри по 150 мг
2 раза в день до
еды

Стероид емес қабынуға қарсы препараттар

- ҚҚСД қабынудың екі фазасына әсер етеді: экссудация және пролиферация.
- Механизмдегі противовоспалительного әрекеті жетекші-белсенділікті тежеу
- циклооксигеназалар, кинин жүйесіне әсері және липидтердің асқын тотығуы.
- қан тамыр қабырғасының өткізгіштігінің азаюы, қабыну медиаторларының белсенділігін тежейді, тіндердегі энергия алмасуының азаюы,
- фибробласттардың бөлінуін және коллаген синтезін тежейді,
- (пролиферативті процестердің дамуына кедергі келтіреді).

Стероид емес қабынуға қарсы препараттар

ҚҚСД жүйелік мақсаты негізделген
аурудың өткір кезеңінде ғана,
қабынудың өршуі және жақын
операциядан кейінгі кезең, тоқтату үшін
қабыну процесінің
хирургиялық жарақат.

НПВС

Болеутоляющее, противовоспалит ельное, жаропонижающе е действие	<i>Ацетилсалицилов ая кислота</i> (Аспирин)	Внутри по 0,5 г после еды
	<i>Парацетамол</i> (калпол, колдрекс, панадол)	Внутри 0,5 г до 4 раз в сутки
	Диклофенак натрия (Диклонак, Вольтарен)	Внутри 0,025 г 2-3 раза в сутки

НПВС

Болеутоляющее, противовоспалительное, жаропонижающее действие	<i>Пироксикам</i> в таблетках по 0,01 г	Внутри по 10 мг 1 раз в сутки
	Найз в таблетках по 100мг	Внутри по 100мг 2раза в день
	<i>Мелоксикам</i> (мовалис) таблетки по 7,5 и 15 мг	Внутри 7,5 мг 1 раз в сутки
	Бензидамин (Тантум, тантум верде) таблетки для рассасывания по 3 мг Спрей 0,15% раствор	Рассасывать каждые 3-4 ч в полости рта Ротовые ванны

НПВС

Для выраженного обезболивающего эффекта, в том числе в послеоперационном периоде	<i>Кетопрофен</i> (ОКИ, кетонал), таблетки по 100 мг	Внутрь по 150мг 2 раза в сутки
	Кеторол(кетанов)	Внутрь однократно или повторно в дозе 10мг(макс в сутки 4таб)
	Раствор ОКИ для полосканий, 150 мг	Ротовые ванны 2раза в день(разводя 10мл в 100мл воды)

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1) <http://stomatologiya.kz/kz/uslugi/paradontologija.html>;

