

*Kostiuk D., Kolesnychenko O., Khrupa O., Kaciun A.
SAN fizjoterapia dzienne gr. 2, V semestr*



**WSPARCIE ŻYWIENIOWE.
DROGI ŻYWIENIOWE**

Przyczyny zmniejszonego przyjmowania pokarmu

Chirurgiczne:

- – zaburzenia żucia i połykania
- – zaburzenia smaku
- – zespół po gastrektomii
- – niewydolność trzustki
- – zwężenie w zespoleniu
- – biegunki i zaparcia
- – ból

Przyczyny zmniejszonego przyjmowania pokarmu

Chemioterapii:

- nudności, wymioty
- zaburzenia smaku i węchu
- zapalenie jamy ustnej
- biegunka

Radioterapii:

- zaburzenia połykania (bole)
- suchość, zapalenie śluzówek
- zwężenia, przetoki



Podstawą do podjęcia leczenia wyniszczenia nowotworowego za pomocą leczenia żywieniowego jest szczegółowa **ocena stanu odżywienia** chorego i jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii.

Ocena stanu odżywienia chorego

Należy rozpocząć od obliczenia procentu ubytku dotychczasowej (normalnej) masy ciała, korzystając z poniższego wzoru:

$$\% \text{ ubytku m.c.} = \frac{\text{normalna m.c.} - \text{aktualna m.c.}}{\text{normalna m.c.}} \times 100$$

Ocena stanu odżywienia na podstawie ubytku masy ciała:

- prawidłowy: $< 5\%$ ubytku masy ciała,
- niedożywienie lekkie: $> 5\%$,
- niedożywienie umiarkowane: $> 10\%$,
- niedożywienie ciężkie: $> 15\%$.

Do oceny stanu odżywienia chorych na nowotwory, przebywających w szpitalach i domach opieki społecznej wykorzystuje się obecnie:

ankietę NRS – Nutritional Risk Screening (ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia), zaleconą przez Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolicznego ESPEN 2002,

bądź nieco starszą **ankietę SGA** – Subjective Global Assessment (subiektywna globalna ocena stanu odżywienia)



**Zarówno niedożywienie białkowo-
kaloryczne, jak i białkowe wymaga
zastosowania odpowiednio dobranej formy
żywienia –
doustnej, dojelitowej lub
pozajelitowej.**

Żywienie doustne

- zapewnienie większej kaloryczności posiłków poprzez podawanie odżywek drogą doustną
- spożywanie przed posiłkami małej ilości alkoholu np. wina czy piwa
- przygotowanie małych porcji ulubionego jedzenia, zwracając uwagę na unikanie zapachów przygotowywanego posiłku, zachowanie higieny jamy ustnej, zmniejszanie przykrych zapachów z owrzodzeń i stomii

Żywienie dojelitowe

U pacjentów, którzy nie mogą przyjmować pokarmów drogą naturalną z powodu zaburzeń połykania, celowe jest rozważenie kontynuacji odżywiania dojelitowego:

- wykonanie zabiegu założenia **gastrostomii** („rurki” do żołądka przez powłoki brzuszne)
- gastrostomia **operacyjna / endoskopowa** (nie może być stosowana u chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, gardła, języka) / **jejunostomia / sonda żołądkowa**
- Odżywanie dojelitowe może być prowadzone w domu i polega na podawaniu specjalnie przygotowanego pokarmu kilka razy dziennie do gastrostomii.

Nawadnianie i żywienie pozajelitowe

- Podawanie wszystkich składników odżywczych drogą dożylną, najczęściej przez tzw. **worek żywieniowy**
- Podawanie niewielkiej ilości płynów (najczęściej 500-1000 ml dziennie) drogą **dożylną**, poprzez wkłucie wenflonu
- Przy trudnościach z uzyskaniem dostępu do żyły jest podawanie płynów drogą **podskórną** (roztwór soli fizjologicznej lub 5% glukozy)

Farmakoterapia



- Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu leków poprawiających **łaknienie** i powodujących **przyrost** masy ciała

Zalecenia dotyczące podaży energii i składników pokarmowych:

Średnia podaż **energii** w żywieniu osób chorych na nowotwory powinna wynosić 30-35 kcal/kg m.c./dobę, u chorych znacznie wyniszczonej można zwiększyć do 40-45.

Zalecana ilość **białka** wynosi ok. 1,3 g/kg m.c./dobę. U chorych katabolicznych podaż białka można zwiększyć do 0,3-0,35 g N/kg m.c./dobę.

Tłuszcze powinny stanowić 25-30% zapotrzebowania energetycznego. Należy zwiększyć zapotrzebowanie na tłuszcze do 50-60% energii kosztem węglowodanów, gdyż komórki nowotworowe wykorzystują glukozę do namnażania się.

Literatura

- Opieka paliatywna dla wolontariuszy, Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej, Poznań, 2008
- Podstawy żywienia w onkologii. Dr n. med. Maciej Żechowicz, Katedra Onkologii WNM UWM