

ҚТЖ КЛИНИКАСЫ, ТҮРЛЕРІ.

РФ протоколы бойынша тері зақымдалуы кезіндегі неғұрлым жиі кездесетін ҚЖТ түрлері:

- Қарапайым
- Гипертрофиялық немесе веррукозды
- Атрофиялық
- Дақты
- Көпіршікті
- Эрозивті- жаралы
- Фолликулярлы

Еріннің қызыл жегісі мен ауыз қуысының шырышты қабатының зақымдалуына қарай 6 топқа жіктеген:

- Қарапайым
- Гиперкератозды
- Жалқықтана –қызарған
- Эрозиялы- жаралы
- Буллезді
- Атипиялық

ҚР протоколы бойынша ҚТЖ
клиникалық түрлері

- қарапайым;
- жалқықтана-қызарған;
- эрозиялы-жаралы;
- буллезді;
- гиперкератозды;
- атипиялық

РФ протоколы бойынша ҚТЖ қарапайым түрінің клиникасы

- Тері бетіндегі папулалардың диаметрі 2-5мм, полигональды болып келеді
- Папулалар алқызыл немесе ашық- күлгін түстес болады
- Балауызға ұқсас жылтыр болады
- Әдетте қабыршықтану аздап қана көрініс береді
- Папулалар бетін қалақшамен қырған кезде қабығы қиын алынады
- “Уикхем торы” белгісі тән
- Тері бетінде ірі жолақтар пайда болады, әсіресе маймен сүрткеннен кейін торлы жолақты көрініс береді.

ҚР протоколы бойынша ҚТЖ қарапайым түрінің клиникасы

- Тері бетіндегі папулалардың көлемі үлкендеу (2-5мм), полтигональды болып келеді
- Көбіне білектер, тізе, қарын, арқа және кеуде терісінде орналасады
- Папулалар көкшіл- қызыл түсті
- Алғашқы кезде беттері тегіс, жүре келе ақшыл- сұр түсті қабыршақтармен жабылады
- Балауызға ұқсас жылтыр болады
- Кейде жеке-жеке, кейде топтаса орналасады
- Аздап қышып, ысып- күй сезімдері болады
- Тері бетінде орналасқан папулаға “Уикхем торы” белгісі тән
- Папуланың бетін өсімдік майымен сүртсе торға ұқсас жіңішке жолақтар пайда болады
- Осыдан соң папуланың беті тегіс емес кедір- бұдырлы екені анықталады
- Папулалар бетін қалақшамен қырған кезде қабығы алынбайды
- Иодты –калий ерітіндісімен боялмайды
- Аймақтық лимфа түйіндері ұлғаймайды
- Ультракүлгін сәуле жібергенде (люминесценттік диагностика) жарақат ошағы ақ-көгілдір жарық береді