

**Ваш сосед пожаловался Вам, что после регулярного в течение месяца приема Анаприлина, назначенного ему в связи с участвовавшими приступами болей в области сердца, стал испытывать затрудненное дыхание. Отмечались редкие приступы бронхоспазма.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Анаприлин.**
- Назовите основные показания к применению данного препарата и побочные действия препарата.**
- Выпишите препарат анаприлин (Anaprilinum) в рецепте в виде раствора в ампулах (0,25%-1ml), используя допустимые сокращения.**

**В детскую больницу с носовым кровотечением поступила 13-летняя пациентка.**

**Дома на протяжении 5 дней у девочки была высокая температура тела и ей давали антипиретик - ацетилсалициловую кислоту.**

**На шестой день болезни у девочки открылось носовое кровотечение, которое удалось остановить тампоной.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Ацетилсалициловая кислота, где он используется в медицине?**
- Назовите основные показания к применению данного препарата и побочное действие препарата.**
- Выпишите препарат аспирин (*Acidum acetylsalicylicum*) в рецепте в виде таблеток (0,5г), используя допустимые сокращения.**

**Больному с диагнозом острый психоз ввели в мышцу 2 мл 2,5% раствора препарата Аминазин.**

**Задания:**

- **Назовите фармакологическую группу препарата Аминазин.**
- **Назовите основные показания к применению препарата Аминазин и побочные действия препарата.**
- **Выпишите препарат аминазин (Aminazinum) в рецепте в виде драже (0,025г), используя допустимые сокращения.**

**Студентка 2 курса медицинского колледжа накануне экзамена по фармакологии, чтобы не заснуть рано и успеть повторить учебный материал, выпила две чашки крепкого кофе.**

**Когда работа была закончена, легла, но долго не могла заснуть, голова оставалась ясной, сохранялась бодрость, сердце билось чаще и сильнее обычного, также девушка испытывала частые позывы к мочеиспусканию.**

**Задания:**

- Какое вещество, содержащееся в кофе, оказывает на организм описанное действие?**
- Назовите фармакологическую группу препарата Кофеин.**
- Укажите возможные осложнения при лечении Кофеином.**
- Выпишите препарат кофеин (Coffeinum natriibenzoas) в рецепте в виде раствора в ампулах (10%-2ml), используя допустимые сокращения.**

**Бригада скорой помощи прибыла на вызов к пожилой женщине. У больной резко повысилось артериальное давление и составило 210/160 мм.рт. ст. Выяснилось, что больная длительное время принимала препарат Клофелин в таблетках в связи с гипертонической болезнью. Последние два дня провела на даче, таблетки забыла дома, поэтому препарат не принимала. Пациентке был поставлен диагноз: гипертонический криз, связанный с отменой Клофелина.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Клофелин**
- Назовите виды фармакологического действия препарата Клофелин. Укажите возможные осложнения при лечении Клофелином.**
- Выпишите препарат клофелин (Clorhelinum) в рецепте в виде раствора в ампулах (0,01%-1ml), используя допустимые сокращения.**

**Пациентке с переломом лучевой кости со смещением перед репозицией (сопоставлением) отломков и наложением гипсовой повязки произведено введение 2% раствора Лидокаина (Ксикаина) в количестве 5 мл в области перелома, после чего врачебные манипуляции перестали вызывать болезненные ощущения.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Лидокаин.**
- Назовите виды фармакологического действия препарата Лидокаин. Где применяется Лидокаин? Укажите возможные осложнения при лечении Лидокаином .**
- Выпишите препарат Лидокаин (Lidocainum) в рецепте в виде раствора в ампулах (10%-2ml), используя допустимые сокращения.**

**Медицинская сестра по назначению врача ввела пациенту, пришедшему в себя после перенесенной операции и испытывающему сильные боли, под кожу 1 мл 1% раствора морфина гидрохлорида, через 15 минут после инъекции пациент успокоился и уснул.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Морфин.**
- Назовите основные показания к применению данного препарата и побочное действие. Укажите возможные осложнения при лечении Морфином . Назовите специфический антидот морфина.**
- 3. Выпишите препарат морфин (Morphini hydrochloridum) в рецепте в виде раствора в ампулах (1%-1ml), используя допустимые сокращения.**

**Менеджер среднего звена одновременно учится на вечернем отделении университета.**

**У женщины появилась раздражительность, вспыльчивость, на самые простые замечания она реагирует бурно, может заплакать. Жалуется на головную боль, расстройство сна. Стала принимать настойку Валерианы на ночь.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата настойка Валерианы.**
- Назовите вид фармакологического действия данного препарата. Какие препараты будут действовать аналогично препаратам Валерианы?**
- Выпишите препарат настойка Валерианы (Tinctura Valerianae) в рецепте в виде настойки (10 ml), используя допустимые сокращения.**



**Бабушка при коликах, связанных со скоплением газов в кишечнике, принимает по 2 таблетки активированного угля в растолчённом виде с водой.**

**Задания:**

- **Назовите фармакологическую группу препарата Уголь активированный.**
- **Укажите основные показания и возможные осложнения при лечении препаратом Уголь активированный.**
- **Выпишите уголь активированный (Carbo activatus) в рецепте в виде таблеток (0,5г), используя допустимые сокращения.**

**Выходя утром из дома, Вы обратили внимание на навязчивый сухой кашель у дежурной по подъезду.**

**В ответ на вопрос о самочувствии, дежурная сказала, что кашель появился у нее через 10 дней регулярного приема Эналаприла, назначенного участковым терапевтом.**

**Задания:**

- Назовите фармакологическую группу препарата Эналаприлат (Энап).**
- Назовите основные показания к применению данного препарата и побочное действие препарата.**
- Выпишите препарат эналаприлат (энап) (Enalaprilum) в рецепте в виде таблеток (0,01г), используя допустимые сокращения.**