Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова

Самостоятельная работа резидента

Выполнила: Курмашева М.

Проверила: Жамалиева Л.М.

Риск возникновения отдаленных осложнений перфорации барабанной перепонки у пациентов амбулаторной практики города Актобе

P

- Пациенты с перфорацией барабанной перепонки 18-35 лет, после амбулаторного лечения

I

- Наблюдение с целью изучения отдаленных осложнений

C

- Нет

O

- Тугоухость, глухота

T

- 20 лет

Цель исследования

Изучить риск развития тугоухости и глухоты в отдаленном периоде, после лечения перфорации барабанной перепонки в амбулаторной практике города Актобе

Задачи исследования

1)Организовать наблюдение за всеми амбулаторными пациентами 2016-2018 годов с перфорацией барабанной перепонки в течение 20 лет с ежегодным обследованием.

2)Оценить риск и частоту развития тугоухости и глухоты.

Дизайн исследования

Когортное исследование

Выборка

отсутствует, есть только критерии включения и исключения.

Критерии включения

Пациенты с перфорацией барабанной перепонки получившие лечение в период с 2016 по 2018 гг. во всех амбулаториях города Актобе

Критерии исключения

Пациенты обратившиеся в стационар после амбулаторного лечения

Этические вопросы

Информированное согласие

Право отказаться от участия в любое время

Польза для общества(выявление рисков инвалидизации – глухота)

Одобрено КЭ

Частота глаукомы у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией.

IMAMURA, YUTAKA; FUJIWARA, TAKAMITSU; SPAIDE, RICHARD F.

Retina. 30(2):267-270, February 2010

Цель: изучение частоты глаукомы и сопутствующих состояний у пациентов с центральной серозной хориоретнопатией (ЦСХ) – заболеванием, связанным с утолщенной сосудистой оболочкой.

Методы: Выполнено исследование «случай-контроль» на группе пациентов с ЦСХ в период с 1 января 2006 года по 31 июля 2008 года и группе пациентов. Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту, были обследованы на глаукому и сопутствующие состояния в одних и тех же условиях в одно время.

Результаты: основная группа состояла из 287 пациентов с ЦСХ, средний возраст составил 56,8 лет, 207 (72,1%) были мужчинами. Контрольная группа состояла из 235 пациентов, средний возраст составил 59,5 лет и 168 (71,5%) были мужчинами. Глаукома была найдена в 10 из 287 пациентов (3,4%) с ЦСХ и в 20 из 235 пациентов контрольной группы (8,5%, P = 0,014, 95% доверительный интервал = 0.16-0.89). Среднее внутриглазного давления были одинаковыми в обеих группах. Тем не менее, число пациентов с диагнозом офтальмогипертензии (0,3% против 3,4%, p = 0,0076) и количество пациентов, использующих гипотензивные глазные капли (3,8% против 13,2%, p <= 0,0001), были значительно меньше в основной группе, чем в контрольной.

Вывод: глаукома и офтальмогипертензия у пациентов с ЦСХ встречаются реже, чем в контрольной группе. У пациентов с ЦСХ увеличенный приток крови к зрительному нерву от сосудистой оболочки может быть фактором, снижающим риск развития глаукомы, но может играть роль и дисперсия внутриглазного давления, и этот фактор нельзя исключить.

P
- Пациенты с центральной серозной хорионретинопатией

I
- Наблюдение

C
- Пациенты без ЦХС

O
- Глаукома

T
- 2 года

Цель исследования: изучение частоты глаукомы и сопутствующих состояний у пациентов с центральной серозной хориоретнопатией (ЦСХ) – заболеванием, связанным с утолщенной сосудистой оболочкой.

Дизайн исследования

Случай-контроль