

The background of the slide is a close-up, artistic photograph of water droplets and bubbles. The droplets are clear and glistening, with some showing internal reflections and refractions of light. The bubbles are of various sizes, some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth and movement. The overall color palette is dominated by light blues, whites, and soft greys, giving it a clean, scientific, and fresh appearance.

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

**ВЫПОЛНЯЛИ: СТУДЕНТКИ
1 КУРСА (102 ГРУППА)**


**РЯЗАНОВА ЕВА И
ЛАУХИНА ВЕРОНИКА**



ЗАДАЧИ:

- СФОРМИРОВАТЬ ЦЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ;
- СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.

ЧТО ТАКОЕ ИППП?



- СУЩЕСТВУЮТ ОКОЛО 30 ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНИЛИ В ОДНУ ГРУППУ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОНИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТАХ. ИХ СОКРАЩЕННО НАЗЫВАЮТ ИППП – ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. ПРИЧИНАМИ ИППП МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ: ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ, ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ, ПРОСТЕЙШИЕ И ДАЖЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ НАСЕКОМЫЕ.

ИППП ИМЕЮТ ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ:

Передаются при сексуальных контактах;

имеют скрытый период. От момента проникновения в организм до появления каких – либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет. Часто протекают скрыто (без каких – либо проявлений) и случайно выявляются при обследовании.

Повреждают многие органы и ткани организма (мочеполовую систему, нервную систему, печень, сердце, кожные покровы).

Более раннее начало лечения чаще приводит к выздоровлению.

Самопроизвольно не излечиваются.

Приводят к большому количеству осложнений (бесплодие, импотенция, параличи, рак, поражение кожи и суставов, потеря зрения и прочее).

Некоторые из этих заболеваний передаются через кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты для татуировок, прокалывание ушей).

Часто встречается сочетание нескольких ИППП у одного человека. Возбудители ИППП легко передаются от человека человеку.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ИППП?

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ К ЧИСЛУ ИППП ОТНОСИЛИ ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- СИФИЛИС;
- ГОНОРЕЯ;
- УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ (МОЛОЧНИЦА)

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛАСЬ ГРУППА ИППП ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ:


- ТРИХОМОНИАЗ;
- ХЛАМИДИОЗ;
- ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС;
- ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОРОДАВКИ;
- ГЕПАТИТЫ В И С;
- ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ;
- ЛОБКОВЫЙ ПЕДИКУЛЕЗ, ЧЕСОТКА.



ТРИХОМОНОЗ ВЫЗЫВАЕТСЯ ПРОСТЕЙШИМ ОРГАНИЗМОМ – ТРИХОМОНАДОЙ



трихомонада






T. vaginalis
(мочеполовая, влагалищная)



T. tenax
(ротовая)

T. hominis
(кишечная)


ХЛАМИДИОЗ




ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС





УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ (МОЛОЧНИЦА)






СИФИЛИС



ГОНОРЕЯ



РИСК ЗАРАЖЕНИЯ СПИДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

- ПРИ БЕСПОРЯДОЧНЫХ ПОЛОВЫХ СВЯЗЯХ
- ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТАХ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

ГРУППЫ РИСКА

- НАРКОМАНЫ
- БИСЕКСУАЛИСТЫ
- ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ



СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

Через столовые приборы

При пользовании общим туалетом

При совместном купании в бассейне

При рукопожатии

При поцелуе

Через слезы , слюни и при чихании и кашле

Через укусы насекомых

БЕЗОПАСНО

1. ДОНОРСТВО
2. ПОСЕЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИК,
БОЛЬНИЦ



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫЯВИЛИ ИППП?



Как можно раньше начать лечение, назначенное врачом.



Обязательно соблюдать режим и дозировку приема лекарств.




Позаботиться о том, чтобы защитить себя от ИППП в будущем.



ЕСЛИ ИППП НЕ ЛЕЧИТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ, ТО:

- ОНИ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ;
- ПОЗДНО НАЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМ.



КАК МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИ Я ИППП?

Воздерживаться от внебрачных сексуальных контактов.

Отказаться от контактов со случайными сексуальными партнерами.

Сохранять взаимную верность с единственным сексуальным партнером (обязательно здоровым).

Правильно использовать качественный презерватив при каждом сексуальном контакте.


Не использовать в медицинских целях нестерильные иглы, шприцы, чужие инструменты.

Соблюдать правила личной гигиены.

Не брать чужие и не давать другим людям свои вещи (белье, одежду, полотенца и прочее).

Воздержаться от употребления алкоголя и наркотических веществ.

Под их воздействием часто совершаются необдуманные поступки.



ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ВИЧ

- ОБЩЕМИРОВОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, В 2020 Г. СОСТАВИЛО 37,7 МЛН [30,2 МЛН–45,1 МЛН] ЧЕЛОВЕК.
- ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ В 2020 Г. СОСТАВИЛО 1,5 МЛН [1,0 МЛН–2,0 МЛН] ЧЕЛОВЕК.
- ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СВЯЗАННЫХ СО СПИДОМ БОЛЕЗНЕЙ В 2020 Г., СОСТАВИЛО 680 000 [480 000–1,0 МЛН] ЧЕЛОВЕК.
- 27,5 МЛН [26,5 МЛН–27,7 МЛН] ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЛИ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ В 2020 Г.
- 79,3 МЛН [55,9 МЛН–110 МЛН] ЧЕЛОВЕК ИНФИЦИРОВАЛИСЬ ВИЧ С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ.
- 36,3 МЛН [27,2 МЛН–47,8 МЛН] ЧЕЛОВЕК УМЕРЛО ОТ СВЯЗАННЫХ СО СПИДОМ БОЛЕЗНЕЙ С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ.

The background is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the frame.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!)**