Федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный медико-хирургический Центр
имени Н.И. Пирогова
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Временное руководство ISTH по распознаванию и лечению коагулопатии при COVID-19. 14 мая 2020 года.

Жибурт Евгений Борисович

ezhiburt@yandex.ru
www.transfusion.ru

Received: 20 March 2020 | Accepted: 21 March 2020

DOI: 10.1111/jth.14810

RECOMMENDATIONS AND GUIDELINES

ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19

Jecko Thachil[1] | Ning Tang[2] | Satoshi Gando[3] | Anna Falanga[4,5] | Marco Cattaneo[6] | Marcel Levi[7] | Cary Clark[8] | Toshiaki Iba[9]

[1]Department of Haematology, Manchester University Hospitals, Manchester, UK

[2]Tongji Hospital, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

[3]Department of Acute and Critical Care Medicine, Sapporo Higashi Tokushukai Hospital, Sapporo, Japan

[4]Department of Transfusion Medicine and Hematology, Hospital Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy

[5]University of Milan Bicocca, Monza, Italy

[6]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano, ASST Santi Paolo e Carlo, Milan, Italy

[7]Department of Medicine and Cardio-metabolic Programme-NIHR UCLH/UCL BRC, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, London, UK

[8]Director of Programs and Education, International Society on Thrombosis and Haemostasis, Carrboro, North Carolina

[9]Department of Emergency and Disaster Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan

Correspondence: Jecko Thachil, Department of Haematology, Manchester Royal Infirmary, Oxford Road, Manchester M13 9WL, UK.
Email: jecko.thachil@mft.nhs.uk

transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru



transfusion.ru

Экспериментальные методы

Гипотеза смягчения избыточной генерации тромбина

Антитромбин
Рекомбинантный тромбомодулин
Гидроксихлорохин

Гипотеза борьбы с «иммунотромбозом» (двунаправленная связь между воспалением и тромбозом)

Иммуносупрессоры, включая ингаляции методы лечения, которые могут поставить проверку на модели

transfusion.ru



У пациентов с коагулопатией потребления при отсутствии кровотечений следует поддерживать уровень тромбоцитов выше $20*10^9$/л, фибриногена – выше 2,0 г/л. У пациентов с кровотечениями следует поддерживать уровень тромбоцитов выше $20*10^9$/л, фибриногена – выше 2,0 г/л, протромбиновое отношение <1,5.

25

50

1,5

transfusion.ru

transfusion.ru

Расписание

Вход на портал

Формы заявок на учебу, в т.ч. нмо

Книга-почтой

Спасибо за внимание!

Жибурт Евгений Борисович

+7 985 2117951

ezhiburt@yandex.ru

www.transfusion.ru