



# Решение задач по теме "Закон Кулона"



MyShared

## **Проверка знаний**

- 1. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при увеличении каждого заряда в 3 раза, если расстояние между ними уменьшить в 2 раза?**



- **2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при перенесении их из среды с диэлектрической проницаемостью, равной 7, в вакуум, если расстояние между зарядами останется неизменным?**



- **3. Два одинаковых металлических шара заряжены одинаковыми по модулю, но разноименными зарядами. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз изменилась сила взаимодействия?**



- **4. Как изменится сила взаимодействия между зарядами, если расстояние между ними увеличить в 2 раза?**

- **5. Два электрона находятся на расстоянии 1 мм друг от друга. Что больше, сила электрического взаимодействия или гравитационного взаимодействия?**




## **Проверь себя:**

- 1. Увеличится в 36 раз.
- 2. Увеличится в 7 раз.
- 3. Сила равна нулю.
- 4. Уменьшится в 4 раза.
- 5. Больше сила электромагнитного взаимодействия.




## **Решение задач**


- 1. Заряды 10 и 16 нКл расположены на расстоянии 7мм друг от друга. Какая сила будет действовать на заряд 2нКл, помещенный в точку, удаленную на 3мм от меньшего заряда и на 4мм от большего заряда?**



- 2. Три точечных электрических заряда находятся в вершинах прямоугольника. Определите силу, с которой первые два заряда действуют на третий, если расстояние между третьим и первым зарядами – 1 см, вторым и третьим – 3 см, а величина зарядов: первый –  $(-1\text{нКл})$ , второй –  $(-4\text{нКл})$ , третий –  $1\text{нКл}$ .



- З. Маленький шарик массой  $0,002\text{кг}$ , подвешенный на тонкой шелковой нити, несет на себе заряд  $0,3\text{ мкКл}$ . На какое расстояние снизу к нему следует поднести другой маленький шарик с зарядом  $0,5\text{ мкКл}$ , чтобы натяжение нити уменьшилось в 2 раза?



- 4. В трех вершинах квадрата со стороной 10см находятся одинаковые точечные положительные заряды по 30нКл. С какой силой будут действовать эти заряды на положительный точечный электрический заряд 20нКл, расположенный в четвертой вершине квадрата?

