



**78-Й НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:
«МЕДИЦИНА XXI СТОЛЕТИЯ»**

**ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.
ГОРЬКОГО**

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ


АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Лукьянова Л. Э.

**студентка 5 курса
медицинского факультета
Научный руководитель - Резниченко И.В.**

Краматорск 2016


Актуальность




Актуальность

Климактерический синдром является комплексом

- нейровегетативных,
- психологических,
- соматических изменений, которые сопровождаются угасанием женской гормональной функции.



Актуальность



- здоровые женщины климактерического периода
- с проявлениями климактерического синдрома

Актуальность

Следовательно, актуально изучение процессов происходящих в организме женщины в период перехода от репродуктивного возраста к старости и обеспечение здоровья, а значит, качества жизни, профессиональной и социальной деятельности женщин этого возраста.

Цель исследования

Изучить клинические особенности течения климактерического синдрома

□ наиболее распространенные жалобы

□ влияние количества приливов жара на работоспособность, общее состояние и самочувствие пациенток.

Материалы и методы

Было обследовано

- 36 пациенток
- в возрасте от 45 до 58 лет, средний возраст составил 51,5 лет.

Изучены

- анамнез
- данные клинического,
- лабораторного,
- инструментального исследований.

Оценивали

- жалобы пациенток (раздражительность, головная боль, бессонница)
- количество приливов в течение суток
- данные УЗИ
- общего анализа мочи
- массу тела

Классификация климактерического синдрома по степени тяжести:


Легкая степень – приливы жара до 10 раз в сутки

Средняя степень тяжести – приливы жара 10-20 раз в сутки

Тяжелое течение – приливы жара более 20 раз в сутки

Результаты

В ходе обследования было установлено:



Результаты

<u>Приливы жара до 10 раз в сутки.</u>	<u>Приливы жара 10-20 раз в течение суток.</u>	<u>Приливы жара более 20 раз в сутки.</u>
Общее состояние и работоспособность не нарушена.	Ухудшение общего состояния и снижение работоспособности.	Почти полная потеря работоспособности.
6 пациенток	11 пациенток	18 пациенток
16,6 %	30,5 %	50 %
Легкое течение	Средняя степень тяжести	Тяжелое течение

Выводы

При оценке полученных данных было выявлено:

- климактерический синдром клинически проявляется преимущественно нейровегетативными нарушениями;
- у половины женщин с климактерическим синдромом отмечается тяжелое течение заболевания (50%),
- почти у каждой третьей (30,5%) его проявления носят умеренный характер
- и только в 16,6% климактерический синдром сопровождается легкими проявлениями.



Спасибо за внимание!