

# Причины и ранняя диагностика РДА

Выполнил: Кригер Данил

# Ранний детский аутизм – это?

- Ранний детский аутизм – это расстройство, которое возникает в результате нарушения развития головного мозга. Оно характеризуется повторяющимися и характерными паттернами поведения и трудностями в социальном общении и взаимодействии. Симптомы присутствуют с раннего детства и влияют на повседневное функционирование.



# Основные причины возникновения аутизма у детей



- Нужно отметить, что причины возникновения РАС всегда врожденные, т.е. приобретенный аутизм – это миф. Это расстройство может быть выявлено и в зрелом возрасте, но здесь речь идет о проблемах ранней диагностики.

# Основные симптомы РАС у детей

- Коммуникативные трудности. Дети могут не реагировать на свое имя, избегать контакта глаза в глаза. Часто дети с РАС не понимают, как играть или взаимодействовать с другими детьми, поэтому часто бывают в одиночестве.
- Никакого лепета или указывания пальцем в возрасте одного года.
- Разные вербальные способности. Может встречаться как полное отсутствие речи, так и беглая, но неуклюжая речь. Встречаются фразовые и словесные эхолалии – множественные и бессмысленные повторения слогов, окончаний и т.д.
- Проблемы с пониманием и использованием невербальных сигналов. К примеру, дети с РАС могут не понимать, что значит помахать на прощание ручкой.
- Повторяющиеся действия: раскачивания из стороны в сторону, размахивание руками и т.д.

# Диагностика аутизма в раннем возрасте

- Расстройство аутистического спектра диагностируется на основе ранней симптоматики (сочетание коммуникативных нарушений, трудностей в социальном взаимодействии и стереотипного поведения) и критериям DSM-5.
- Решение принимается после наблюдений за ребенком в привычной ему среде, а также беседы с родителями. Проводятся тесты со специальными опросниками. В состав коллегиальной комиссии входит детский психолог, педиатр, детский невролог, психиатр, логопед и другие специалисты.
- Дифференциальная диагностика аутизма необходима для того, чтобы отличить РАС от ряда заболеваний, имеющих схожую симптоматику. Это шизофрения, умственная отсталость, нарушение слуха и зрения и т.д.

# Коррекция РАС у детей. Профилактика и прогноз.

- Важно понимать, что аутизм – это не заболевание, а особенность развития, которое связано с нарушением работы ЦНС. Поэтому не существует никакого «лекарства» от этого расстройства.
- Учитывая неясность точных причин развития аутизма, профилактика РАС не разработана по причине того, что основную роль в развитии аутизма у детей играет генетический фактор. Но дети, которые находятся в группе риска, должны проходить тестирование на задержку развития в 9, 18 месяцев, в 2 и 2,5 года.