

Тема урока:

**Тригонометрические
уравнения.
Арксинус.**

Что такое арксинус?


Рассмотрим $\sin(x) = \sqrt{3}/2$.

Для решения нашего уравнения требуется построить прямую $y = \sqrt{3}/2$ и посмотреть в каких точках она пересекает числовую окружность.

Видно что прямая пересекает окружность в двух точках F и G, эти точки и будут решениями уравнения, переобозначим F как x_1 , а G как x_2 . Решение нашего уравнения мы находили и получили

$$x_1 = \pi/3 + 2\pi k, \text{ а } x_2 = 2\pi/3 + 2\pi k.$$

Решить данное уравнение довольно таки просто, но как решить например уравнение $\sin(x) = 5/6$. Очевидно что это уравнение будет иметь так же два корня, но какие значения будут соответствовать решению на числовой окружности?



Обозначение арксинуса

Давайте внимательно посмотрим на наше уравнение $\sin(x)=5/6$

Решениями нашего уравнения будут две точки $F=x_1+2\pi k$ и $G=x_2+2\pi k$.

x_1 – длина дуги AF , x_2 – длина дуги AG .

Заметим: $x_2=\pi-x_1$, т.к. $AF=AC-FC$, но $FC=AG$,
 $AF=AC-AG=\pi-x_1$

Но, что это за точки?

Столкнувшись с подобной ситуацией, математики придумали новый символ – **$\arcsin(x)$** . Читается как **арксинус**.

Тогда решения нашего уравнения запишутся как:


$$x_1=\arcsin(5/6)$$

$$x_2=\pi-\arcsin(5/6)$$

Тогда решение в общем виде:

$$X = \arcsin(5/6) + 2\pi k \text{ и } x = \pi - \arcsin(5/6) + 2\pi k$$

Арксинус это угол(длина дуги AF , AG) синус которого равен $5/6$



Немного истории.

История происхождения нашего символа совершенно такая же как и у \arccos : Символ \arcsin появляется впервые в работах математика Шерфера и известного французского ученого Ж.Л. Лагранжа, несколько ранее понятие арксинус уже рассматривал Д. Бернули, правда записывал другими символами. Общепринятыми эти символы стали лишь в конце XVIII столетия. Приставка «arc» происходит от латинского «arcus» (лук, дуга), что вполне согласуется со смыслом понятия: $\arcsin x$, например, - это угол (а можно сказать и дуга), синус которого равен x .

Жозе́ф Луи Лагранже́



Определение.

Определение. Если $|a| \leq 1$, то $\arcsin(a)$ – это такое число из отрезка $[-\pi/2; \pi/2]$, синус которого равен a .

$$\text{если } |a| < 1, \text{ то}$$
$$\arcsin a = x \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = a, \\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Если $|a| \leq 1$, то уравнение $\sin(x) = a$ имеет решение:

$$x = \arcsin(a) + 2\pi k \text{ и } x = \pi - \arcsin(a) + 2\pi k$$


Перепишем:

$$x = \pi - \arcsin(a) + 2\pi k = -\arcsin(a) + \pi(1+2k)$$

Ребята, посмотрите внимательно на два наших решения, как думаете можно ли их записать общей формулой?

Заметим, если перед арксинусом стоит знак “плюс”, то π умножается на четное число $2\pi k$, а если знак “минус”, то множитель нечетный $2k+1$. Тогда запишем общую формулу решения для уравнения $\sin(x)=a$

$$x = (-1)^n \arcsin(a) + \pi n$$



Определение.

Есть три случая в которых предпочитают записывать более простым способом решения:

$$\sin(x)=0, \text{ то } x= \pi k$$

$$\sin(x)=1, \text{ то } x= \pi/2 + 2\pi k$$

$$\sin(x)=-1, \text{ то } x= -\pi/2 + 2\pi k$$

Для любого $-1 \leq a \leq 1$ выполняется равенство

$$\arcsin (-a)= - \arcsin (a)$$

Таблица значений арксинуса.

Таблица значений синуса:

T	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
SIN(T)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0

Таблица значений арксинуса:

<i>a</i>	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
arcsin <i>a</i>	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

Пример

Вычислить а) $\arcsin(\sqrt{3}/2)$ б) $\arcsin(-1/2)$ в) $\arcsin(0)$

Решение:

а) Пусть $\arcsin(\sqrt{3}/2) = x$, тогда $\sin(x) = \sqrt{3}/2$ и по определению $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, посмотрим значения синуса в таблице:

$x = \pi/3$, т.к. $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ и $-\pi/2 \leq \pi/3 \leq \pi/2$

Ответ: $\arcsin(\sqrt{3}/2) = \pi/3$

б) Пусть $\arcsin(-1/2) = x$, тогда $\sin(x) = -1/2$ и по определению $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, посмотрим значения синуса в таблице:

$x = -\pi/6$, т.к. $\sin(-\pi/6) = -1/2$ и $-\pi/2 \leq -\pi/6 \leq \pi/2$

Ответ: $\arcsin(-1/2) = -\pi/6$

в) Пусть $\arcsin(0) = x$, тогда $\sin(x) = 0$ и по определению $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, посмотрим значения синуса в таблице:

значит $x = 0$, т.к. $\sin(0) = 0$ и $-\pi/2 \leq 0 \leq \pi/2$

Ответ: $\arcsin(0) = 0$

Пример

Решить уравнение: а) $\sin(x) = -\sqrt{2}/2$ б) $\sin(x) = 0$

Решение:

а) Воспользуемся определением, тогда решение запишется в виде:
 $x = \arcsin(-\sqrt{2}/2) + 2\pi k$ и $x = \pi - \arcsin(-\sqrt{2}/2) + 2\pi k$

Посмотрим в таблице значение: $\arcsin(-\sqrt{2}/2) = -\pi/4$

Ответ: $x = -\pi/4 + 2\pi k$ и $x = 5\pi/4 + 2\pi k$

б) Воспользуемся определением, тогда решение запишется в виде:
 $x = \arcsin(0) + 2\pi k$ и $x = \pi - \arcsin(0) + 2\pi k$

Посмотрим в таблице значение: $\arcsin(0) = 0$

Ответ: $x = 2\pi k$ и $x = \pi + 2\pi k$