
СИФИЛИС




Содержание

- 1. Сифилис
- 2. Симптомы
- 3. Пути передачи
- 4. Диагностика
- 5. Заболеваемость населения
- 6. Заболеваемость мужчин и женщин
- 7. Профилактика

Сифилис

Сифилис — хроническое

системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum*





Симптомы

Средняя продолжительность инкубационного периода — от трех до шести недель. Первым симптомом, который должен насторожить, является образование на месте контакта твердого шанкра безболезненной, но довольно плотной язвы, имеющей округлую форму и диаметр до двух сантиметров. Подобные язвы лишены кровоточивости и не склонны к слиянию. В течение семи дней после возникновения твердого шанкра, лимфатические узлы пораженной зоны увеличиваются. Данный период называется первичным сифилисом. Однако иногда первичные очаги могут отсутствовать, либо находиться на внутренних половых органах (у женщин — на стенке влагалища). Подобное расположение осложняет диагностику.

Пути передачи

- □ Половым путем;
 - □ Через кровь;
- □ Профессиональный путь;
- □ Трансплацентарный путь






Устойчивость

Малоустойчив во внешней среде и гибнет при высыхании, но на холоде сохраняется до 50 суток. Прогревание при температуре 40С в течение часа к утрате патогенных свойств; при 48С бактерии погибают в течении 10 минут.


Патогенез

Проявляется спустя 10-90 дней после первичного инфицирования. Основным симптомом в этой стадии является формирование сифилитической язвы. Лимфоузлы воспаляются, уплотняются, становятся болезненными. Сыпь на коже.

Заболеваемость населения



Заболеваемость мужчин и женщин



Профилактика заболевания

- пользоваться отдельной посудой (тщательно мыть с мылом после употребления)
- пользоваться индивидуальными средствами гигиены
 - избегать половых контактов, поцелуев с больным сифилисом на заразной стадии.

При соблюдении этих элементарных правил риск заразиться сифилисом при бытовом общении минимален.

Литература

«Основы микробиологии и иммунологии» К.С. Камышева

Сайты:

http://venerologia.policlinica.ru/sif 11.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%F4%E8%E

B%E8%F1#.D0.94.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.

BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0

http://fb.ru/article/100068/simptomyi-sifililisa-i-profilaktika