



IMAGETODAY Design Source

# Инфекционная

# безопасность



# Экстренная профилактика

парентеральных вирусных  
гепатитов и ВИЧ-инфекции

Утверждены

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  
18.05.2010 №58

# Приложение 12 к СанПиН

## 2.1.3.2630-10

## При попадании крови или другой биологической жидкости на открытые участки кожи

- Немедленно обработать кожу в течении 30 секунд тампоном, смоченным 70% раствором этилового спирта.
- Вымыть двукратно тёплой водой с мылом.
- Насухо вытереть индивидуальной салфеткой.
- Повторно обработать 70% раствором этилового спирта.

# На слизистую оболочку глаз.

- Промыть водой.
- Обработать 0,05% раствором марганцовокислого калия
- (раствор 1:10000, готовится ex tempore),
- не тереть.
- Или
- Обработать 1%-ым раствором борной кислоты

# На слизистую оболочку носа

- Промыть водой.
- Обработать 0,05% раствором марганцовокислого калия
- (раствор 1:10000, готовится ex tempore),
- не тереть!
- Или
- Обработать 1%-ым раствором протаргола.

# На слизистую оболочку рта

- Прополоскать 70 % раствором спирта
- (не глотать!!!).
- Или прополоскать 0,05% раствором марганцовокислого калия (раствор 1:10000, готовится ex tempore),
- Или обработать 1%-ым раствором борной кислоты.

# При попадании подозрительного материала на халат, одежду.

- При попадании на халат или одежду подозрительного материала необходимо обработать это место тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором.
- Обеззаразить перчатки и снять халат!
- Кожу под загрязненной одеждой протереть 70 % р-ром этилового спирта.



# При попадании на обувь

- При попадании на обувь - обработать двукратно разными тампонами, обильно смоченными дезинфицирующим раствором,
- и смыть водой.

# СанПиН 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции» от 11.01.2011г. №1

## ■ 8.3. Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ.

С целью профилактики профессионального заражения ВИЧ – инфекцией проводится:

- 8.3.1. Комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении различных видов работ.
- 8.3.2. Учет случаев при возникновении профессиональных травм и т.д.

### 8.3.3. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте

- **Медицинский работник обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией.**

## 8.3.3.1. При повреждении кожных покровов, при порезах и уколах

- Обработать перчатки дезинфицирующим раствором, снять их.
- Выдавить кровь из ранки и обработать место укола 70% раствором этилового спирта.
- Вымыть руки с мылом.
- Обработать место укола 5% раствором йода.
- На место травмы после обработки наложить бактерицидный пластырь.

- **Как можно быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ.**

■ **8.3.3.3.1. Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течении первых двух часов после аварии, но не позднее 72 часов!**

- Пример: если произошла аварийная ситуация после проведения комплексных мероприятий по 8.3.3.1., следует обратиться к дежурному врачу приемного отделения (в течении первых двух часов), получить 2 таблетки (никовира) (ГКБ№3) и в дальнейшем продолжать принимать надлежащие меры при данной аварийной ситуации.

# При высоком риске заражения

- Попавшие в аварийную ситуацию (глубокая рана при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом при оказании мед. помощи), должны сдать кровь на ВИЧ сразу после аварии (для исключения возможного факта уже имеющегося инфицирования). Затем через 3 и 6 месяцев.
- Встать на диспансерный учет у врача-инфекциониста.
- При высоком риске заражения немедленно проконсультироваться у специалиста в области ВИЧ-инфекции, по показаниям начинать как можно раньше (лучше в первые 2 часа, желательно не позднее 36 часов с момента аварийной ситуации, после 72 часов может быть поздно) антиретровирусную профилактику.
- В случае заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей мед. работник имеет право на соц.защиту, предусмотренную законом.

# Поверхность рабочего стола

При загрязнении кровью или биологической жидкостью поверхность стола обрабатывается дезинфицирующим раствором двукратно с интервалом 15 минут.

Осколки стекла ( если они есть) также заливаются дез.раствором и через час убираются с помощью уборочного инвентаря.



# Регистрация

- Каждый случай опасного контакта или аварии с кровью должен быть зафиксирован.
- Регистрация осуществляется в журнале регистрации аварийных случаев медицинского персонала отделения, который должен находиться на каждом посту дежурной медсестры
- и журнале учёта травм медицинских работников



# Аптечка Анти СПИД

- Находится в каждой процедурной и перевязочной, имеет соответствующую инструкцию для оказания первой медицинской помощи при аварийной ситуации.
- При возникновении проблем связанных с поиском необходимых средств, немедленное обильное промывание кожи и слизистых проточной водой и мытье с мылом кожных покровов не менее 6 раз, затем обязательное следование инструкции.



# Потенциально опасную работу

- Нужно начинать:
- будучи психологически и физически подготовленным к рискам ;
- концентрируя внимание и проявляя предельную осторожность;
- показании экстренной помощи в нестандартных условиях проявлять особую осторожность с учетом отсутствия необходимых условий.