



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный государственный медицинский университет"

Онконастороженность. Кто должен её проявлять?

Выполнила студент лечебного факультета
V курса 13 группы Богданов М.А.

Определение

- Онконастороженность - это готовность увидеть в каждом из симптомов болезни указание на возникший или прогрессирующий опухолевый процесс.
- Онконастороженность - это предвзятое отношение к любой болезни и к любым жалобам: в каждом конкретном случае врач будет выбирать такую лечебно-диагностическую тактику, чтобы не пропустить предраковое состояние и начальные формы раковой опухоли.

Некоторые признаки опухолевого процесса

- Кожа: появление пятен, высыпаний, узелков или уплотнений, красного воспалительного ободка вокруг.
- Голова и шея: появления незаживающих язв и трещин на слизистых оболочках, образование уплотнений узлов, продолжительные боли в горле, увеличение лимфоузлов, длительная осиплость голоса.
- Лёгкие: длительный кашель, изменение характера кашля, появление кровянистой мокроты при кашле, боль во время кашля, чувство давления в области грудной клетки, частые пневмонии.

Некоторые признаки опухолевого процесса

- Молочная железа: появление уплотнения, чрезмерной чувствительности, асимметрия сосков, появление язвочек на соске, появление высыпаний, кровянистые выделения из соска и увеличение подмышечных лимфоузлов.
- Лимфатические узлы: увеличение размеров, повышение температуры тела без причины, слабость, выраженное похудение, ночная потливость.
- Пищевод и желудок: отсутствие аппетита, трудности во время глотания, частые боли в области живота, рвота с примесью крови, дегтеобразный чёрный стул, резко выраженное похудение.

Некоторые признаки опухолевого процесса

- Мочевыделительная система: появление крови в моче, частые боли в области поясницы, частые мочеиспускания при обычном потреблении воды.
- Половые органы у женщин: изменения менструальных выделений, кровотечения в межменструальном периоде или после сексуального контакта.
- Половые органы мужчины: затруднение мочеиспускания, появление уплотнений узелков, боли внизу живота, появление любых выделений из уретры.

Кто должен проявлять онконастороженность?

- Врачи любой специальности, в связи с тем, что некоторые симптомы могут указывать как на опухолевый процесс, так и на патологию другого рода.
- Сами пациенты, которые могут не придавать значения симптомам, до тех пор, пока патология не проявит себя более грозно, либо не выявится случайно или в ходе диспансеризации.