





**Түйінді Периартерит**

Бұл дерт кезінде бұлшық ет тектес артерияларды қоршап тұрған ұлпалар зақымдалады, содан кейін ұсақ артериялар зақымдалады.




# Себебі:

- Инфекциялар
- Жарақаттар
- Көбіне 30-40 жастағы ер адамдар ауырады. Ауру бірден немесе біртіндеп басталуы мүмкін.



# Клиникасы:


- Дене қызуы көтеріледі
  - Денесінде қызыл дақтар пайда болады
  - Тахикардия
  - Буындары аурады
  - Науқастар шаршағыш, әлсіреген болады
  - Арықтайды
  - Ауру дами келе ішкі ағзаларды да зақымдайды. Инфаркт, стенокардия дамуы мүмкін.
- 

# Диагностика

- Қан анализінде – лейкоцитоз, анемия, ЭТЖ жоғарлайды.
- Асқазандағы артериялар зақымданса, асқазанда ауырсынулар пайда болады, диспепсиялық өзгерістер болуы мүмкін. Бүйрек артериялары зақымданса, лейкоцитурия, гематурия, протеинурия, т. б. пайда болады.
- Тыныс алу ағзалардың артериялары зақымданса:
  - демікпе
  - пневмония дамиды.

- Миға баратын артериялар зақымданса:
- бас ауруы
- Тырысулар
- Психоздар дамиды



- Бұл дерт ағымы бойынша 3 түрге бөлінеді:
  - Жіті
  - Созылмалы
  - Орташа
  - Жіті түрде ауру бірнеше жұмаға ғана созылады
  - Орташа түрде 3-9 айға созылады
  - Созылмалы түрде ауру бірнеше жылдарға созылады
- 

# Емі

- Қозу кезінде науқастарды ауруханада емдиді.
- Гармондармен емдейді: 60-80 мг иммунодепрессанттар, аспирин 3-4г, ибупрофен, бруфен, индометацин қолданады. Жүрегі ауырса, нитроглицерин, валидол береді.