


# Курсовая работа

## Синтез адипиновой кислоты


Выполнили:  
студенты ИМП НГУ  
Старицын М.В,  
Тресцов И.О.  
Преподаватель:  
к.х.н Таратайко А.И.

# Методика синтеза

1. Собираем реакционную установку
2. В круглодонную колбу емкостью 200 мл помещаем азотную кислоту и нагреваем её до кипения.
3. К кипящей кислоте через воронку по каплям добавляем циклогексанол.
4. После того как весь циклогексанол прибавлен, реакционную смесь кипятим ещё 10-15 минут, затем переносим смесь в стакан.
5. Охлаждаем при комнатной температуре.
6. Выделившуюся смесь отфильтровываем на воронке Бюхнера, промываем небольшим количеством воды и сушим на воздухе.





# Химическая реакция



Наименование	Молекулярная масса (г/моль)	Ткип/Тпл (°C)	Плотность (г/см <sup>3</sup> )	Объём (мл)	Масса (г)	Моли
Циклогексанол	100	161/20-22	0,962	20,8	20	0,2
Азотная кислота	63	82,6/-41,6	1,4-1,41	85	119	1,13

# Механизм реакции



## Характеристика полученного вещества

- Полученное вещество является белым снегообразным порошком. Выход 20,48г (70% от теоретически возможного). У нас получилось больше вещества, чем должно было получиться по методике. Это может быть следствием остатка воды в веществе.
- Температура плавления 145-150 °С (литературная температура плавления 151-153 °С)