

# «Վարիկոզ» տերմինը բառացի նշանակում է՝ հանգույց, փքվածություն



- Ջաճախ հանդիպում է ստորին վերջույթների շրջանում,
- Ուղիղ աղու և հազվադեպ՝ մարսողական համակարգի երակների շրջանում
- Արգանդի շրջանում

# Պատճառներն են՝

👉 Սեռը,

👉 Տարիքը /35+/  

---

👉 Ավելորդ քաշը, ծանրությունը

👉 Հղիությունը

👉 Ոտքի վրա երկար աշխատելը

👉 Նստակյաց ապրելակերպը

👉 Բարձրակրունկ և/կամ սխալ կոշիկների կիրառումը

👉 Ժառանգական նախատրամադրվածությունը




**!** Կանայք այս հիվանդությամբ 3 անգամ հաճախ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ:

# Վարդագույն ուրվաանիւթ յուճը ուսուցիչների մասնագիտական հիվանդուղթ յուճըններից է



# Յիվանդության ախտանիշներն են՝

- Ուռքերում ցավի առաջացումը
- Ստորին վերջույթներում այրոցի և տաքության զգացողությունը
- Ճանրության զգացողությունը
- Ուռքերի այտուցվածությունը երեկոյան
- Գիշերային ցավը ուռքերում
- Մազանոթային աստղիկների ու ցանցի առաջացումը
- Երակների լայնացումը
- Քորի զգացողություն



# Վարիկոզ հիվանդության փուլերը

ԴԻՄԵԼ ԲԺԻՇԿԻ

ԱՆՋԱՊԱՂ ԴԻՄԵԼ ԲԺԻՇԿԻ

C0

Ճանրության զգացում



C1

Անոթային աստղիկների փուլ



C2

Տեսանելի վարիկոզ



C3

Այտուցներ



C4

C5


C6

Լավացող և չլավացող տրոֆիկ խոցեր



# ԲՈՒԺՈՒՄ

▶ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ



▶ ՈՋ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ



▶ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

▶ ՎԻՐԱՅԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ



# Մենք առաջարկում ենք խնդրի լուծում՝ **Տուրբոմիկրոն Ջի** դեղամիջոցը

Պարունակում է՝  
դիօսմին և բնական բաղադրիչ՝ հիսպերիդին  
ստացվում է ցիտրուսներից


Նպաստում է **անոթների պատերի  
առաձգականության ու տոնուսի  
բարձրացմանը**



# Արդյունավետ միջոց երակային անբավարար



- Հանում է ուղեքի ց
- Ծանրության զգաց
- Եվազեցնում է ուղք
- Առանձնանում է լա
- Արտադրվում է Իսպ
- GMP-ի ստանդարտ



26  
թերթեր





# ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

## << ԴԱՍԱԺԱՄՆ ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԻԿՈՂԻ >>



# ԱԿՑԻԱ

Գնիր 1 տուփ **ՏՈՒՐԲՈ G**  
*միկրոն*



+



Ստացիր 1 տուփ **ՏՈՒՐԲՈ G**  
*միկրոն*

Այցիան գործում է հետևյալ դեղատնային ցանցերում՝

 Նատալի Ֆարմ	 Գեղեմն Ռիֆատեր
 Ալֆա Ֆարմ	 Տոնուս-Լես
 Վազա Ֆարմ	Այլընտրանքային դեղատուն՝ _____

# Տուրբումիկրոն Ջի-ն ցուցված է վարիկոզ հիվանդության բոլոր փուլերում

---

.Վարիկոզի վաղ փուլերում

.Ուշ փուլերում, երբ վիրահատական բուժումն անխուսափելի է դառնում,

*Դեղամիջոցի օգտագործումը վիրահատությունից հետո կանխարգելում կամ դանդաղեցնում է հիվանդության կրկնությունը՝ անոթային համակարգի էլաստիկության ու տոնուսի բարձրացման շնորհիվ*



# Տուրբոմիկրոն Ջի-ի դոզավորումը

Նշանակվում է թե՛ կանխարգելիչ՝ հիմնականում տարվա շոգ եղանակին և թե՛ բուժական նպատակներով՝ վարիկոզի սրացումների դեպքում

Օրական 2 հաբ՝ **ուտելուց հետո**

*կամ միանվագ,*

*կամ առավոտյան և երեկոյան*



Նվազագույն ընդունման կուրսը 2-3 ամիս՝  
տարեկան 2 անգամ

# Տուրքումիկրոն Ձի-ի դոզավորումը թուլթքի դեպքում

1-4 օր՝ 2  դեղահաբից օրական 3 անգամ

5-7 օր՝ 2  դեղահաբից օրական 2 անգամ

8-րդ օրվանից սկսած՝ 1  դեղահաբից օրական 2 անգամ

*Նվազագույն ընդունման կուրսը 1 ամիս*

# Տուրբո Միկրոն Ջի՝ Վերականգնեք Ձեր ոտքերի թեթևությունն ու գեղեցկությունը ...

