

«Վարիկոզ» տերմինը բառացի նշանակում է՝ հանգույց, փքվածություն



- Ջաճախ հանդիպում է ստորին վերջույթների շրջանում,
- Ուղիղ աղու և հազվադեպ՝ մարսողական համակարգի երակների շրջանում
- Արգանդի շրջանում

Պատճառներն են՝

👉 Սեռը,

👉 Տարիքը /35+/

👉 Ավելորդ քաշը, ծանրությունը

👉 Հղիությունը

👉 Ոտքի վրա երկար աշխատելը

👉 Նստակյաց ապրելակերպը

👉 Բարձրակրունկ և/կամ սխալ կոշիկների կիրառումը

👉 Ժառանգական նախատրամադրվածությունը




! Կանայք այս հիվանդությամբ 3 անգամ հաճախ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ:

Վարդագույն ուրվաարխիվները ուսուցիչների մասնագիտական հիվանդություններից է



Յիվանդության ախտանիշներն են՝

- Ուռքերում ցավի առաջացումը
- Ստորին վերջույթներում այրոցի և տաքության զգացողությունը
- Ճանրության զգացողությունը
- Ուռքերի այտուցվածությունը երեկոյան
- Գիշերային ցավը ուռքերում
- Մազանոթային աստղիկների ու ցանցի առաջացումը
- Երակների լայնացումը
- Քորի զգացողություն



Վարիկոզ հիվանդության փուլերը

ԴԻՄԵԼ ԲԺԻՇԿԻ

ԱՆՋԱՊԱՂ ԴԻՄԵԼ ԲԺԻՇԿԻ

C0

Ճանրության զգացում



C1

Անոթային աստղիկների փուլ



C2

Տեսանելի վարիկոզ



C3

Այտուցներ



C4

C5


C6

Լավացող և չլավացող տրոֆիկ խոցեր



ԲՈՒԺՈՒՄ

▶ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ



▶ ՈՋ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ



▶ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ



▶ ՎԻՐԱՅԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

Մենք առաջարկում ենք խնդրի լուծում՝ **Տուրբոմիկրոն Ջի** դեղամիջոցը

Պարունակում է՝
դիօսմին և բնական բաղադրիչ՝ հիսպերիդին
ստացվում է ցիտրուսներից


Նպաստում է **անոթների պատերի
առաձգականության ու տոնուսի
բարձրացմանը**



Արդյունավետ միջոց երակային անբավարար



- Հանում է ուղեքի ց
- Ծանրություն զգաց
- Եվազեցնում է ուղք
- Առանձնանում է լս
- Արտադրվում է Իսպ
- GMP-ի ստանդերտ



26
թերթեր



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

<< ԴԱՍԱԺԱՄՆ ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԻԿՈՂԻ >>



ԱԿՑԻԱ

Գնիր 1 տուփ **ՏՈՒՐԲՈ G**
միկրոն



+



Ստացիր 1 տուփ **ՏՈՒՐԲՈ G**
միկրոն

Ապօրինակ գործում է հետևյալ դեղատեսակին ցանցերում՝

 Նատալի Ֆարմ	 Գեղեմն Ռ-փյատեր
 Ալֆա Ֆարմ	 Տոնուս-Լես
 Վազա Ֆարմ	Այլընտրանքային դեղատուն՝ _____

Տուրբումիկրոն Ջի-ն ցուցված է վարիկոզ հիվանդության բոլոր փուլերում

.Վարիկոզի վաղ փուլերում

.Ուշ փուլերում, երբ վիրահատական բուժումն անխուսափելի է դառնում,

Դեղամիջոցի օգտագործումը վիրահատությունից հետո կանխարգելում կամ դանդաղեցնում է հիվանդության կրկնությունը՝ անոթային համակարգի էլաստիկության ու տոնուսի բարձրացման շնորհիվ



Տուրբոմիկրոն Ջի-ի դոզավորումը

Նշանակվում է թե՛ կանխարգելիչ՝ հիմնականում տարվա շոգ եղանակին և թե՛ բուժական նպատակներով՝ վարիկոզի սրացումների դեպքում

Օրական 2 հաբ՝ **ուտելուց հետո**

կամ միանվագ,

կամ առավոտյան և երեկոյան



Նվազագույն ընդունման կուրսը 2-3 ամիս՝
տարեկան 2 անգամ

Տուրքումիկրոն Ձի-ի դոզավորումը թուլթքի դեպքում

1-4 օր՝ 2  դեղահաբից օրական 3 անգամ

5-7 օր՝ 2  դեղահաբից օրական 2 անգամ

8-րդ օրվանից սկսած՝ 1  դեղահաբից օրական 2 անգամ

Նվազագույն ընդունման կուրսը 1 ամիս

Տուրբո Միկրոն Ջի՝ Վերականգնեք Ձեր ոտքերի թեթևությունն ու գեղեցկությունը ...

